مقاييس الجسم وبعض الأدلة الشكلية للجاموس العراقي

اسعد يحيى عايد^١ عبدالحسن حمدان عبدالله^٢ محمد عبدالعزيز اللوزي^٢ مجيد شناوه سفيح^١

١- كلية الزراعة/جامعة البصرة. ٢- كلية الزراعة/جامعة المثنى

الخلاصة

جمعت البيانات للفترة من ٢٠٠٧/١٢/٢ لغاية ٢٠٠٨/٢/٢٠ في المناطق المحيطة بمركز مدينة السماوة /محافظة المثنى/العراق. شملت هذه البيانات مقاييس الجسم لـ ١٤٠ من ذكور واناث الجاموس العراقي بعمر شهر - ١٠ سنوات. كما حسبت العلاقة بين مقاييس الجسم والعمر لكل من الذكور والاناث باستخدام الانحدار الخطي والتربيعي والتكعيبي واللوغاريتمي إضافة إلى معادلة Gompertz. ازدادت مقاييس الجسم معنوياً لكلا الجنسين مع تقدم العمر حتى عمر سنتين. وأظهرت الذكور مقاييس أعلى من الإناث غير إن جميع الاختلافات لم تصل إلى المعنوية. والذي يوضح أن نمو الهيكل العظمي لهذه الحيوانات وصل أقصاه عند عمر ٢-٣ سنة. وانخفض دليل عمق الصدر ودليل طول الجسم معنوياً ($P < 0.05$) مع تقدم العمر لكلا الجنسين. وعلى العكس من ذلك ازداد دليل ارتفاع الصدر ودليل ارتفاع الجسم معنوياً ($P < 0.05$) مع تقدم العمر، إذ بلغا أقصاهما عند عمر ٣ سنوات فأكثر. امتازت جميع طرق قياس انحدار المقاييس والعمر بأنها معنوية ($P < 0.01$) ولكنها اختلفت بقيمة معامل التحديد أو درجة الدقة للمقياس. فقد امتاز الانحدار اللوغاريتمي بارتفاع درجة الدقة ولجميع الصفات المدروسة إذ تراوحت قيمته ٨١.٨% للارتفاع عند الموخرة إلى ٨٩.١% لمحيط البطن. تماثل معامل نمو المقدر بنموذج Gompertz لكل من الارتفاع عند المقدمة والموخرة ومحيط الصدر والبطن، والتي اختلفت عن معامل نمو طول الجسم الذي اظهر أعلى قيمة. وتفوق كل من محيط الصدر والبطن

من حيث أعلى قيمة يصل إليها المقياس المتماثل (A) يليهما الارتفاع عند المقدمة والموخرة وكان اقلها طول الجسم الذي لم يتجاوز ١٠٠ سم. واتصفت جميع العلاقات بدرجات دقة عالية (أكبر من ٧٩%) مما يمكن الاعتماد على هذا النموذج في تقدير مقاييس الجسم المختلفة.

المقدمة

أجريت العديد من الدراسات لمعرفة أهمية حجم الجسم ووزنه على إنتاج الحليب في الماشية. ووجد العديد منهم أن الأبقار كبيرة الحجم تنتج حليباً أكثر (Sieber, et al, 1988). وعلى الرغم من النتائج المتضاربة بين إنتاج الحليب وأبعاد الجسم لدى ماشية الحليب، وجد البعض ارتباطاً سالباً وغير معنوي بينما وجد آخرون ارتباطاً موجباً ومعنوي. ومن ناحية أخرى، تعد مقاييس الجسم في نهاية النمو مهمة في وضع معايير أدلة الانتخاب لصفات الأداء المختلفة والتي تمتاز بمكافئات وراثية متوسطة وعالية (Crimella et al, 2003).

واختلفت مقاييس الجسم اعتماداً على التركيب الوراثي للجاموس فقد وجد (Burton et al 2005) طول الجسم والارتفاع عند المقدمة ومحيط الصدر وعرض الصدر وعمق الصدر في الجاموس الاندونيسي ١٢٦-١٦٠ و ١٢٥-١٣٧ و ١٨٥-٢١٥ و ٤١-٤٩ و ٦٧-٧٧ سم على التوالي. بينما تفوقت مقاييس الجسم في الجاموس الايطالي على هذه المقاييس كثيراً (Campanile et al, 2003)، والسبب يعود الى الاختلافات الوراثية ووجود برنامج تحسين وراثي في الجاموس الايطالي. ويعتقد بغدسار (١٩٩٠) بان الجاموس العراقي مقاربا في

محيط صدره وطوله وارتفاعه عند المقدمة مع سلالتى الموراه والنيلي/رافي ومتفوقا على سلالة البهادواري والسورتي الهندية.

ولقلة الدراسات على مقاييس الجسم وأدلتها في الجاموس العراقي والتي توصف الشكل الخارجي لهذا النوع من الحيوانات وطبيعة نموها جاءت هذه الدراسة.

المواد وطرائق العمل

جمعت البيانات للفترة من ٢٠٠٧/١٢/٢ لغاية ٢٠٠٨/٢/٢٠ في المناطق المحيطة بمركز مدينة السماوة /محافظة المثنى/ العراق. شملت هذه البيانات مقاييس الجسم لـ ١٤٠ حيوان من عمر شهر حتى عمر ١٠ سنوات. واعتمد في تقدير العمر بناء على معلومات المربين والتي تم مطابقتها مع طريقة تقدير العمر بالتسنين والاستعانة بأطباء بيطريين ذوي خبرة بهذا الموضوع. يقدم العلف الخشن (تبن الرز) على مدار اليوم مع ٣-٤ كغم/رأس/يوم طحين الحنطة كعلف مركز مرة واحدة عند الظهر مع توفر ماء الشرب بصورة حرة. وأخذت مقاييس الجسم وأدلتها كما أوردتها كل من *Campanile et al* (2003) و *Crimella et al* (2003) وهي بصورة مختصرة، طول الجسم عبارة عن المسافة من منتصف الرأس (بين الأذنين) إلى قمة الذيل. الارتفاع عند الأرجل الأمامية عبارة عن المسافة بين صفيحة الكتف إلى الأرض. أما محيط الصدر والذي يقاس خلف الأكتاف ومقدمة البطن. وعمق الصدر يمثل اعرض مساحة من الصدر وعمق الصدر عبارة عن ارتفاع الصدر.

والأدلة حسبت كالآتي: دليل عمق الصدر=عمق الصدر/الارتفاع عند المقدمة، دليل ارتفاع الصدر=ارتفاع الصدر/الارتفاع عند المقدمة، دليل ارتفاع الجسم=الارتفاع عند المقدمة/طول الفخذ، دليل طول الجسم=الارتفاع عند المؤخرة/طول

الجسم ، الدليل النسبي لطول الجسم= طول الجسم* ١٠٠/الارتفاع عند المقدمة، دليل التعظم=محيط الساق* ١٠٠/محيط الصدر. وحسبت المقاييس والأدلة لكل من الذكور والإناث وبالأعمار المختلفة.

حسبت الاختلافات بين الذكور والإناث باستخدام تحليل التباين والذي يشمل تأثير الجنس والعمر والتداخل بينهما بطريقة النماذج الخطية العامة *General Linear Models* في البرنامج الإحصائي الجاهز (1998) SPSS. كما حسبت العلاقة بين مقاييس الجسم والعمر لكل من الذكور والإناث باستخدام الانحدار الخطي والتريبيعي والتعبيبي واللوغاريتمي إضافة إلى معادلة *Gompertz* والتي تتلخص:

$$W=A. \exp(-\exp(B-Ct))$$

حيث أن:

$$W = \text{أي مقياس للجسم،}$$

$$A = \text{المقياس المتماثل (الناضج) Asymptotic للجسم،}$$

$$B = \text{معدل النمو لأي مقياس،}$$

$$C = \text{معامل النمو لأي مقياس،}$$

$$t = \text{العمر بالأيام.}$$

وحددت أهمية كل علاقة من خلال حساب دقة القياس (معامل التحديد R^2) وتباين الخطأ التجريبي. كما حسبت العلاقة بين معاملات *Coefficients* معادلة *Gompertz*، وأجريت هذه الحسابات باستخدام البرنامج الإحصائي الجاهز *SPSS(1998)*.

النتائج والمناقشة

يوضح الجدول (١) مقاييس الجسم المختلفة. ازدادت ($P < 0.01$) مقاييس الجسم لكلا الجنسين مع تقدم العمر حتى عمر سنتين بعدها أصبحت غير معنوية.

يوضح الجدول (٢) أن دليل عمق الصدر ودليل طول الجسم انخفض معنوياً ($P < 0.05$) مع تقدم العمر لكلا الجنسين مما يبين بان هذه الصفة تصل إلى أعلى قيمة لها بأعمار مبكرة بينما الارتفاع عند الموضة يزيد مع تقدم العمر ويتأخر في الوصول إلى درجة النضج حتى أعمار متقدمة. وعلى العكس من ذلك دليل ارتفاع الصدر ودليل ارتفاع الجسم اللذين ازدادا معنوياً ($P < 0.05$) مع تقدم العمر، إذ بلغا أقصاهما عند عمر ٣ سنوات فأكثر (الجدول، ٢).

وأظهرت الذكور مقاييس أعلى من الإناث غير إن جميع الاختلافات لم تصل إلى المعنوية. والذي يوضح أن النمو في الهيكل العظمي لهذه الحيوانات وصل إلى أقصاه عند عمر ٢-٣ سنة عند دخول الحيوانات إلى سنتها الإنتاجية الأولى. تتفق هذه النتائج مع تلك التي حصل عليها بغدسار (١٩٩٠)، الذي وضح بان إناث الجاموس العراقي تبدأ بتوقف نموها عند حصول أول دورة شبق لديها والذي يحصل بعمر ٢٢ شهر.

الجدول (١) مقاييس الجسم (سم) المختلفة لذكور وإناث الجاموس العراقي بعمر اقل من سنة وأكثر (المتوسط ± الخطأ القياسي)

العمر						المقياس
٣ سنوات فأكثر		١-٢ سنة		اقل من سنة		
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	
146.93±1.31	146.01±1.25	139.54±1.55	138.07±1.40	96.42±1.65	92.72±2.86	طول الجسم
86.73±1.47	85.86±1.19	78.78±1.77	76.94±1.62	53.57±1.72	48.54±2.95	طول الصدر
46.92±0.12	46.44±0.19	43.90±0.17	43.28±0.26	29.94±0.49	27.71±1.02	طول الفخذ
58.56±1.25	58.13±1.12	53.48±1.10	52.86±1.34	36.43±1.34	34.63±1.24	ارتفاع الصدر
139.22±1.11	138.48±1.37	135.46±1.17	134.58±1.39	93.26±1.36	91.92±1.01	الارتفاع عند المقدمة
133.04±1.21	132.02±1.24	128.44±1.37	127.69±1.18	86.40±1.55	83.04±2.41	ارتفاع الظهر
139.98±1.13	139.55±1.19	135.79±1.22	134.66±0.56	93.36±1.40	91.54±1.90	ارتفاع الموضة
80.48±0.11	79.87±0.24	73.78±0.60	72.29±0.90	39.85±0.79	34.51±3.14	عمق الصدر
229.27±0.52	227.35±0.63	213.84±1.17	210.07±1.31	105.78±1.54	97.61±3.90	محيط الصدر
23.75±0.10	23.54±0.07	22.15±0.07	21.92±0.07	15.58±0.16	15.0457±0.43	محيط عظم الساق

*تفوق معنوي ($P < 0.01$) مقارنة بمجموعة اقل من سنة للذكور والإناث ولجميع المقاييس

الجدول (٢) بعض أدلة مقاييس الجسم لذكور وإناث الجاموس العراقي بالأعمار المختلفة (المتوسط±الخطأ القياسي)

العمر	الجنس	دليل عمق الصدر	دليل ارتفاع الصدر	دليل ارتفاع الجسم	دليل طول الجسم	الدليل النسبي لطول الجسم	دليل التعظم
أقل من سنة	ذكور	51.12±2.04	37.57±1.66	131.16±1.11	67.16±1.46	100.59±1.46	11.57±0.66
	إناث	47.58±1.48	38.67±1.18	130.17±1.36	66.29±1.28	102.37±1.28	10.40±0.69
١-٢ سنة	ذكور	46.29±1.52	39.27±1.15	131.19±1.44	65.73±1.23	102.59±1.11	10.35±0.96
	إناث	45.53±1.34	39.49±1.04	131.49±1.27	65.26±1.16	103.02±1.30	10.34±0.86
٣ سنة فأكثر	ذكور	41.93±1.11	42.25±1.03	132.13±1.16	63.79±1.15	105.83±1.10	10.29±0.75
	إناث	41.41±1.34	42.41±1.06	132.38±1.08	63.29±1.24	105.94±1.02	10.24±0.78

الموخرة إلى ٨٩.١% لمحيط البطن. مما يدل أن هذه الطريقة توضح العلاقة بين مقاييس الجسم المختلفة والعمر بصورة أفضل من العلاقة الخطية لاسيما إن هناك معامل انحدار واحد فقط مقارنة بالانحدار التربيعي والتكعيبي اللذان لهما معاملان وثلاث معاملات على التوالي، وزيادة المعاملات تؤدي إلى زيادة في درجة الدقة.

الجدول (٣) انحدار مقاييس الجسم المختلفة على العمر حسب نماذج مختلفة

يبين الجدول (٣) والاشكال (١-٥) معامل انحدار مقاييس الجسم المختلفة على العمر محسوبا بطرق مختلفة. امتازت جميع الطرق بأنها معنوية ($P < 0.01$) ولكنها اختلفت بقيمة معامل التحديد أو درجة الدقة للمقياس. فقد امتاز الانحدار اللوغاريتمي بارتفاع درجة الدقة ولجميع الصفات المدروسة إذ تراوحت قيمته ٨١.٨% للارتفاع عند

الصفة المعتمدة	الطريقة	مقدار القطع (b0)	معامل الانحدار الخطي (b1)	معامل الانحدار التربيعي (b2)	معامل الانحدار التكعيبي (b3)	معامل التحديد (R^2)	مستوى المعنوية
طول الجسم	خطي	٥٢.٢٨٠	٠.٠١٤			٦٩.٩٠٠	٠.٠١
	لوغاريتمي	-٤.٥٧٣	١١.٨٦٢			٨٢.٤٠٠	٠.٠١
	تربيعي	٤٦.٣٦١	٠.٠٣١	-٠.٠٠٠٠٠٥		٧٧.٨٠٠	٠.٠١
	تكعيبي	٤٣.٠٠٤	٠.٠٥٢	-٠.٠٠٠٠٠٢	٣×10^{-٩}	٨٠.٢٠٠	٠.٠١

٠.٠١	٦٧.٤٠٠			٠.٠١٤	٩٣.٢٩٨	خطي	الارتفاع عند المقدمة
٠.٠١	٨٨.٠٠٠			١٢.٤٦٨	-٣٢.٤٧٢	لوغاريتمي	
٠.٠١	٨٢.٥٠٠		-٠.٠٠٠٠٠٧	٠.٠٣٧	٨٤.٩٦٣	تربيعي	
٠.٠١	٨٥.٥٠٠	١٠×٣ ٩	-٠.٠٠٠٠٠٣	٠.٠٦٢	٨١.١٠٦	تكعيبي	الارتفاع عند المؤخرة
٠.٠١	٥٤.٦٠٠			٠.٠١٢	٩٩.٩٣٨	خطي	
٠.٠١	٨١.٨٠٠			١١.٨٠٥	-٤١.٠٨٥	لوغاريتمي	
٠.٠١	٧٦.١٠٠		-٠.٠٠٠٠٠٨	٠.٠٣٩	٩٠.١٤٥	تربيعي	محيط الصدر
٠.٠١	٨١.٢٠٠	١٠×٥ ٩	-٠.٠٠٠٠٠٣	٠.٠٧١	٨٥.٢٦٩	تكعيبي	
٠.٠١	٧١.٠٠٠			٠.٠٣٣	١٢٦.٥٩٦	خطي	
٠.٠١	٧٢.٣٠			٢٨.٨٧٧	-١٤.١٥١	لوغاريتمي	محيط البطن
٠.٠١	٨٩.٠٠٠		-٠.٠٠٠٠٠٢	٠.٠٩٠	١٠٥.٩٨٨	تربيعي	
٠.٠١	٩١.٥٠٠	١٠×٧ ٩	-٠.٠٠٠٠٠٦	٠.١٤١	٩٨.١١٨	تكعيبي	
٠.٠١	٦٧.٩٠٠			٠.٠٣٤	١٣٢.٥٢٩	خطي	محيط البطن
٠.٠١	٨٩.١٠٠			٣٠.٢٦٤	-١٥.٢٢٤	لوغاريتمي	
٠.٠١	٨٥.٩٠٠		-٠.٠٠٠٠٠٢	٠.٠٩٦	١١٠.٥١٣	تربيعي	
٠.٠١	٨٧.٢٠٠	١٠×٧ ٩	-٠.٠٠٠٠٠٥	٠.١٣٥	١٠٤.٤٤٠	تكعيبي

الشكل (١): انحدار طول الجسم (سم) على العمر (شهر) باستخدام نماذج انحدار مختلفة

الشكل (٢): انحدار الارتفاع عند المقدمة (سم) على العمر (شهر) باستخدام نماذج انحدار مختلفة

الشكل (٣): انحدار الارتفاع عند المخرة (سم) على العمر (شهر) باستخدام نماذج انحدار مختلفة

الشكل (٤): انحدار محيط الصدر (سم) على العمر (شهر) باستخدام نماذج انحدار مختلفة

الشكل (٥): انحدار محيط البطن (سم) على العمر (شهر) باستخدام نماذج انحدار مختلفة

الارتفاع عند المقدمة والموخرة وكان اقلها طول الجسم الذي لم يتجاوز ١٠٠ سم. واتصفت جميع العلاقات بدرجات دقة عالية (اكبر من ٧٩%) مما يمكن الاعتماد على هذا النموذج في تقدير مقاييس الجسم المختلفة. وتميز الارتفاع عند المقدمة بأقل تباين للخطأ مما يعطي إضافة أخرى لإمكانية استخدام هذه العلاقة في وصف نمو الجسم من خلال المقاييس المختلفة.

وعند استخدام معادلة Gompertz لوصف العلاقة بين كل من طول الجسم والارتفاع عند المقدمة والموخرة ومحيط الصدر والبطن والعمر (الجدول، ٤ والشكل، ٦). توضح النتائج تماثل معامل نمو كل من الارتفاع عند المقدمة والموخرة ومحيط الصدر والبطن. غير أن معامل نمو طول الجسم اختلف كثيرا عنها واظهر قيمة أعلى. ومن ناحية ثانية تفوق كل من محيط الصدر والبطن من حيث أعلى قيمة يصل إليها المقياس المتماثل Asymptotic يليهما

الجدول (٤) العلاقة بين مقاييس الجسم والعمر حسب معادلة Gompertz

تباين الخطأ	درجة الدقة %	المعاملات (Coefficients)			المقياس
		C	B	A	
٨٩.٥٩٧	٧٩.٢٦١	٠.٠٣٩	-٠.٣٠٣	٩٢.٥٠٣	طول الجسم
٦٣.٦٨٣	٨٥.٧٥٠	٠.٠٠٢	-٠.٧٠٥	١٣٠.٧٢١	الارتفاع عند المقدمة
٧٨.١٤٥	٨١.٨٨١	٠.٠٠٣	-٠.٧١٧	١٣٢.٠٦١	الارتفاع عند المخرة
١٩٢.١٠٢	٩١.٦٠٠	٠.٠٠٢	-٠.٢٢٨	٢١٤.١٠٤	محيط الصدر
٣٢٤.٠٧٤	٨٧.٥٤٦	٠.٠٠٢	-٠.٢٣٤	٢٢٣.٨١٦	محيط البطن

$A =$ المقياس المتماثل (سم)، $B =$ (سم) ، $C =$ معامل النمو (سم/يوم)
 درجة الدقة = ١ - (مجموع مربعات الخطأ / مجموع المربعات الكلية المخصصة)

المتماثل وان الحيوانات التي تظهر معدلات نمو سريعة تصل إلى المقياس الناضج بفترة اقصر من تلك التي تنمو بمعدلات أبطأ. ولم يظهر معدل النمو (B) ارتباطا معنويا مع باقي المقاييس عدا في حالة الارتفاع عند الموقرة إذ ارتبط معنويا وموجبا مع (C).

يوضح الجدول (٥) العلاقة بين معاملات معادلة Gompertz. إذ اظهر المقياس المتماثل (A) ارتباطا سالبا ومعنويا مع معامل الزيادة في أي مقياس (C) تراوحت قيمته بين -٠.٤٥٧ في حالة الارتفاع عند المقدمة إلى -٠.٧٧١ لطول الجسم، مما يوضح إن كلما ازداد معدل النمو صغر المقياس

الشكل (٦) العلاقة بين مقاييس الجسم المختلفة والعمر حسب معادلة Gompertz

الجدول (٥) معاملات الارتباط بين معاملات معادلة Gompertz

C	A		مقاييس الجسم
٠.١٤٥٣	٠.261	B	طول الجسم
	-0.771**	C	
٠.٣٣٨	٠.١٩٨	B	الارتفاع عند المقدمة
	-0.616**	C	
٠.٥٦٢**	٠.١٠٥	B	الارتفاع عند المؤخرة
	-0.457**	C	
٠.٤٢٩	٠.٠٩٩	B	محيط الصدر
	-٠.٥٨٩**	C	
٠.٤١٤	٠.١٠٨	B	محيط البطن
	-٠.٦٠١**	C	

** ارتباط معنوي ($p < 0.01$)

Body measurements and some morphological indexes of Iraqi Buffalo

Asaad Y. Ayied¹ Abdul-Hassan H. Abdullah² Mohammed Al-Lozi² Mgeed Sh. Sfeah¹College of Agriculture, University of Basra. 2- College of Agriculture, -١
University of Al-Muthana

the minimum (less than 100 cm). All relations got high determinant coefficient (>79%).

SUMMARY

The data were collected during the period 2/12/2007 till 20/2/2008 from the areas around Semawa city center of the Governorate of Al-Muthana. They were body measurements of 140 buffalo aged one month till 10 years. The measurements were body length, chest length, rump length, wither height, chest height, rump height, chest depth, chest girth and chin girth. The index of chest depth, chest height, body height, body length, relative body length and boniness were calculated. Relationship between body measurements and age was estimated by using linear, quadratic, cubic, logarithmic and Gompertz models. All males and females body measurements increased significantly as age proceeded till the age of two years. Males showed higher insignificant measurements in comparison with females. This explain that bone growth of buffalo reach plateau at the age of 2-3 years. Chest depth and body length indices decreased significantly with proceeded age for both sexes. On contrary, chest height and body height increased as age proceeded and reached maximum growth at the age of three years and more. All regression models of body measurements and age were significant ($p < 0.01$), however they showed different determinant coefficients, as logarithmic obtained the highest values (81.8% for height at rump and 89.15 for bunch girth). Growth coefficients of Gompertz model of wither height, rump height, chest girth and bunch girth were similar, which differed than that of body length (showed the highest value). Asymptotic measurements were higher for chest girth and bunch girth followed by height at wither and rump. While that of body length was

المصادر

بغداد، كربيت (١٩٩٠) مقاييس الجسم وأثرها في الصفات الإنتاجية والتناسلية في الجاموس العراقي. رسالة دكتوراه، جامعة بغداد.

Burton, J. A., S. Hedges, and A. H. Mustari. (2005). The taxonomic status, distribution and conservation of the lowland anoa *Bubalus depressicornis* and mountain anoa *Bubalus quarlesi*. Mammal Review; 35(1): 25-50.

Campanile, G., Di Palo, R., De Rosa, C., Peretti, V., Amante, L., Ciotola, F. and Coletta, A. (2003). Preliminary results on Mediterranean Italian Buffalo morfometry. Ital. J. Anim. Sci., 4: (SUPPL. 1), 337-339.

Crimella, C., Barbieri, S., Giuliani, M.G., and Zecchini, M. (2003). Body measurements and morphological indexes of a cattle population in the Adamawa region (Cameroon). Ital. J. Anim. Sci., 4: (SUPPL. 1), 340-342.

Sieber, M., Freeman, A.E. and Kellet, D.H. (1988) Relationships between body measurements, body weight and productivity in Holstein dairy cows. J. Dairy Sci., 71:3437- 3445.

SPSS (1998). Statistical Packages for Social Sciences. Version 9. USA.