

تقييم نوعية اليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس باستعمال بادئات تجارية مختلفة

علي خضير جابر الركابي

قسم علوم الاغذية - كلية الزراعة - جامعة البصرة

الخلاصة

صنع اليوغرت من حليب الابقار والجاموس باستعمال بادئات تجارية مختلفة (Y_{480} و Y_{450} و Y_{330} و Y_{382}) . قيمت نوعية اليوغرت المصنع بقياس قيم الاس الهيدروجيني (pH) والحموضة الكلية خلال مدة الحضان (٢٤٠ دقيقة) ووقت خزن اليوغرت البالغة ٢١ يوما . اظهرت النتائج ان اليوغرت المصنع من البادئ Y_{450} اعطى اقل قيمة لـ pH واعلى قيمة للحموضة الكلية خلال مدة الحضان ووقت خزن اليوغرت . كما اعطى البادئ Y_{450} اعلى نسبة نضوح للشرش وللنتروجين الذائب / النتروجين الكلي مقارنة ببقية البادئات .

اظهر اليوغرت المصنع من البادئ Y_{480} أعلى مستوى من حامض اللينوليك المقترن والفعالية المضادة للاكسدة كما اعطى افضل نتائج تقييم حسي (النكهة والقوام والطعم والقبول العام) مقارنة ببقية البادئات ، كما شخصت العديد من المركبات ذات الفعالية البيولوجية في اليوغرت المصنع من البادئ Y_{480} بتقنية مطيافية الاشعة تحت الحمراء (FTIR) وشخصت الاحماض الدهنية ونسبها بتقنية كروماتوغرافيا الغاز السائل المتصل بمطياف الكتلة GC/MS واظهرت النتائج ان اليوغرت المصنع من البادئ Y_{480} احتوى على كميات اكبر من الاحماض الدهنية مقارنة بالحليب المستعمل في الصناعة .

المقدمة

يعد اليوغرت من اقدم منتجات الالبان التي عرفها الانسان والتي تعود اصول صناعته الى اواسط اسيا (Lee and Lucey, 2010) . كما يعد من اكثر المنتجات استهلاكاً في العالم لقيمتها التغذوية وتأثيراته الصحية الايجابية فضلا عن خصائصه الوظيفية (Arslan and Bayrakei, 2016) . اشتقت كلمة يوغرت (Yoghurt) من الكلمة التركية Jugurt ، وفي العراق له عدة تسميات ففي الشمال يسمى ماست Mast وفي الوسط لبن Leban ، اما في جنوب العراق فيسمى روبة Roba (Arslan and Bayrakei, 2016)، وبالامكان تقييم نوعية اليوغرت بدراسة صفاته الفيزيوكيميائية

والحسية والخصائص التغذوية والبيولوجية والصحية لاسيما المتعلقة بالفعاليات المضادة للاكسدة Antioxidative Activity ومحتوى حامض اللينوليك المقترن Conjugated Linoleic Acid التي لها الدور الكبير في تقليل الاصابة بأمراض القلب والشرابين من خلال دور المتشابهات Isomers لاسيما C_{18:2} - C₉ T₁₁ الذي يعيق تكون الجذور الحرة في الاحماض الدهنية غير المشبعة Polyunsaturated Fatty Acid لقدرته على العمل كمادة كلابية Chelating Agent وبالتالي عمله كمضاد للاكسدة (Ha et al., 1990) .

كما يمكن تقييم النوعية بالتقنيات الحديثة مثل تقنية FTIR التي استعملت من قبل Paucean et al. (2014) لتقييم نوعية الحليب المجفف ، ولم تستعمل هذه التقنية سابقا لتقييم نوعية اليوغرت بتشخيص مركباته البيولوجية ، كما يمكن بالامكان استعمال تقنية GC/MS لتشخيص الاحماض الدهنية النادرة Odd Fatty Acid ذات الفعالية البيولوجية المهمة تغذويا وتصنيعيا والتي تتكون نتيجة الفعالية الانزيمية للبادئات المستعملة في تصنيع اليوغرات .

لذا هدف البحث لمعرفة اياً من البادئات التجارية الاربعة (Y₄₅₀ و Y₄₈₀ و Y₃₃₀ و Y₃₈₂) الافضل من حيث النوعية التصنيعية والبيولوجية والصحية وذلك بالتركيز على حامض اللينوليك المقترن والفعالية المضادة للاكسدة وكذلك التركيز على المركبات الفعالة بيولوجيا والمشخصة بتقنية FTIR والاحماض الدهنية ذات التأثيرات الصحية بتقنية GC/MS ، اضافة لمتابعة التغيرات الحاصلة في الاس الهيدروجيني والحموضة الكلية ونضوح الشرش والنتروجين الذائب / النتروجين الكلي وذلك بتصنيع اليوغرت من حليب الابقار والجاموس وبالاخص ان النوع الثاني من الحليب متوفر في مناطق الاهوار الواقعة جنوب العراق .

المواد وطرائق البحث

المواد المستعملة :

الحليب : تم الحصول على حليب الابقار من محطة الابحاث الزراعية / كلية الزراعة / جامعة البصرة ، اما حليب الجاموس فتم الحصول عليه من احد المربين في منطقة الكرمة / محافظة البصرة .

البادئات : تم الحصول عليها من شركة Sacco-Sacco الايطالية عن طريق Prof. Dr. Riccardo Bozzi اثناء الدورة التدريبية الدولية لجامعة فلورنس الايطالية المنعقدة في شهر تشرين الاول/ ٢٠١٦ - جامعة البصرة .

طرائق العمل :

صناعة اليوغرت : صنع اليوغرت في المختبر الريادي الايطالي التابع لقسم علوم الاغذية / كلية الزراعة / جامعة البصرة واستعمل للتصنيع ٢٠ كغم من حليب الابقار و ٢٠ كغم حليب جاموس واجريت عملية التصنيع حسب الطريقة التي ذكرها (Yilmaz and Kurdal (2014) وكما يلي :

١ - سخن الحليب لدرجة حرارة ٩٠ م لغرض ترسيب بروتينات الشرش ، ثم برد الى ٤٥ م وقسم الى اربعة اقسام بواقع ٥ كغم واضيفت البادئات لكل قسم بنسبة ٢% .

٢ - صب كل قسم من الحليب المعامل بالبادئات في عبوات بلاستيكية مختبرية خاصة للحضن وبواقع ٥٠٠غم / عبوة .

٣ - حضنت العبوات في الحاضنة بدرجة حرارة ٤٣ م \pm ٢ م وتركت لمدة اربعة ساعات وتم متابعة التغير في الرقم الهيدروجيني الحاصل والحموضة الكلية كل ٦٠ دقيقة ولغاية ٢٤٠ دقيقة ، ثم وضعت العبوات بالتبريد بدرجة حرارة ٤ م بعد اتمام عملية التخثر .

تقدير الاس الهيدروجيني : قدر باستعمال جهاز pH-meter المجهز من شركة Sartorius الالمانية وحسب الطريقة التي ذكرها (Egan *et al.* (1988) .

تقدير الحموضة الكلية **Total Acidity** : قدرت بتسحيح ٩ غم من اليوغرت باستعمال ٠.١ عياري هيدروكسيد الصوديوم بوجود دليل الفيتولفثالين وحسب الطريقة التي ذكرها (Egan *et al.* (1988) وحسبت الحموضة التسحيحية حسب المعادلة التالية:-

$$\text{الحموضة الكلية \%} = \frac{\text{حجم القاعدة المستهلكة} \times \text{ع القاعدة} \times \text{الوزن المليمكافى لحمض اللاكتيك}}{100 \times \text{وزن النموذج}}$$

تقدير نضوح الشرش **Whey Synresis** : قدر حسب الطريقة التي وصفها Panesar and Shinde (2011) بوضع ٢٠ غم من نماذج اليوغرت في انبوبة بلاستيكية واجري الطرد المركزي لها بسرعة ١٠٠٠ دورة/ دقيقة لمدة ١٥ دقيقة . وزن الراشح وحسبت النسبة المئوية للنضوح حسب المعادلة :

$$\text{\% لنضوح الشرش} = (\text{وزن الشرش} / \text{وزن النموذج}) \times 100$$

تقدير النتروجين الكلي : قدر بطريقة كدال حسب الطريقة (Uaboi-Egbenni *et al.* (2010) وذلك بهضم ٢ غم من النموذج بحامض الكبريتيك المركز ثم التقطير .

تقدير النتروجين الذائب : قدر حسب طريقة (Uaboi-Egbenni *et al.* (2010) بوزن ١٠ غم من النموذج واضيف اليه ١٠٠ مل من ماء المقطر ، خلط جيدا ثم نقل الى دورق حجمي سعة ٢٥٠ مل واكمل الحجم الى العلامة ، رشح المحلول بورق ترشيح No. 42 ونقل ١٠ مل من الراشح الى قنينة هضم كدال واضيف اليه حامض الكبريتيك المركز ثم التقطير .

تقدير المحتوى الكلي لحامض اللينولييك المقترن (CLA) Conjugated Linoleic Acid

قدر حسب الطريقة التي ذكرها (Colakoglu and Gursoy (2011) بخلط ٥ غم من اليوغرت مع ١٠ مل من كحول الايزوبرانول بصورة جيدة بواسطة الرجاج لمدة دقيقتين ، اضيف اليه ٨ مل من الهكسان مع الرج لمدة دقيقتين ، ثم اجري الطرد المركزي بسرعة ٣٠٠٠ دورة/دقيقة ، اخذت الطبقة العلوية للراشح وقيس الامتصاص الضوئي بجهاز المطياف الضوئي Spectrophotometer المجهز من شركة Apel اليابانية بطول موجي ٢٣٣ نانومتر وحسب التركيز من المنحنى القياسي المحضر بعمل تراكيز من CLA القياسي تراوحت بين (٠ - ٤٠٠) ميكروغرام/ مل مذابة في الهكسان وقياس الامتصاصية بنفس الطول الموجي .

قياس الفعالية المضادة للاكسدة Antioxidative Activity : قيست حسب الطريقة التي وصفها (Gjorgievski *et al.* (2010) وذلك بأخذ ١٥ غم من اليوغرت ، اجري له الطرد المركزي بسرعة ٩٠٠٠ دورة/ دقيقة واخذ ١ مل من الجزء الراشح واخلط مع ٤ مل ايثانول تركيز ٩٥% و ٤.١ مل حامض اللينولييك تركيزه ٢.٥% في الايثانول و ٨ مل من محلول منظم الفوسفات تركيز ٥٠ ملي مولاري برقم هيدروجيني ٧ ، خزن الخليط بدرجة حرارة ٤٥ م لمدة ٢٤ ساعة ثم اضيف اليه ٠.١ مل من هذا الخليط الى ٩.٧ مل ايثانول تركيز ٧٥% و ٠.١ مل ثايوسيانات الامونيوم تركيز ٣٠% ثم اضيف اليه ٠.١ مل من كلوريد الحديدوز تركيز ٢٠ ملي مولاري محضر في ٣.٥% حامض الهيدروكلوريك الى خليط التفاعل لتكوين معقد احمر اللون مع البيروكسيدات الناتجة من الاكسدة ، حضر نموذج العينة الضابطة بنفس الطريقة اعلاه باستثناء خلط ١ مل من الماء المقطر بدلا من العينة ، قيست الامتصاصية للنماذج ونموذج العينة الضابطة عند الطول الموجي ٥٠٠ نانومتر والذي عنده تتضح اقصى امتصاصية لمعقدات المركبات المضادة للاكسدة مع ايون الحديدوز وقيست الفعالية المضادة للاكسدة وفقا للمعادلة الاتية :-

الفعالية المضادة للاكسدة (%) = ١٠٠ - [قراءة امتصاصية النموذج / قراءة امتصاصية العينة الضابطة (× ١٠٠)] .

التقييم الحسي لليوغرت: اجري التقييم الحسي لمنتوج اليوغرت المصنع من الحليب الابقار والجاموس بعمر خزني ١٤ يوما من قبل خمسة متخصصين في مجال علوم الاغذية والالبان في قسم علوم الاغذية / كلية الزراعة / جامعة البصرة وحسب الاستمارة التي ذكرها (Arslan and Bayrakc (2016)

تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية GC-MS

١- استخلاص الدهن : استخلص دهن حليب الابقار والجاموس ودهن اليوغرت المصنع منهما حسب طريقة (Rodriguez *et al.* (2010) ، خلط ٣ غم من العينة مع ٦ مل من الايزوبروبانول Isopropanol مع الرج لمدة دقيقة بالرجاج Vortex ، اضيف ٥ مل من الهكسان النقي تركيز ٩٩ % مع الرج لمدة دقيقة ثم اجريت عملية النبذ المركزي بسرعة ٢٠٠٠ دورة/دقيقة لمدة ٥ دقيقة وبدرجة حرارة ٤ م .

٢- الاسترة :اجريت عملية الاسترة حسب الطريقة المذكورة في (A.O.A.C. (2000) ، تعتمد هذه الطريقة على تفاعل الكليسيريدات مع هيدروكسيد البوتاسيوم المثيلي المحضر بإذابة ١١.٢ غم من هيدروكسيد البوتاسيوم في ١٠٠ مل من الميثانول ، اجريت الاسترة بوزن ١ غم من العينة في انبوبة سعتها ١٥ مل اضيف ٥ مل من هيدروكسيد البوتاسيوم المثيلي ، رجت الانبوبة بالرجاج لمدة ٥ دقائق ، اضيف ٥ مل من الهكسان النقي ، رجت المحتويات وتركت حتى انفصال طبقتين ، تحتوي الطبقة العلوية استرات المثيل للاحماض الدهنية في الهكسان والمواد المتصبنة موجودة في الطبقة السفلية .

٣- التشخيص بجهاز GC / MS

شخصت العينات بواسطة تقنية كروماتوغرافيا الغاز المتصل بمطياف الكتلة نوع Shimadzu GC/MS – PQ2010 Ultra في مختبر GC- MS / كلية الزراعة / جامعة البصرة وحسب ظروف الفصل التالية:-

نوع العمود DP-5MS (30 M × 0.25 mm i.d., filmthickness 0.25µm) واستعمل غاز الهليوم كغاز حامل وبمعدل جريان ١ مل / ثانية و درجة حرارة الحاقن و الناقل البيني كانت ٢٨٠ م . تم ضبط برنامج فرن GC على درجة حرارة اولية مقدارها ١٠٠ م لمدة ١ دقيقة بعدها تم رفع حرارة الفرن

الى ٢٨٠ درجة مئوية بواقع ٦ درجات حرارية بالدقيقة وتم مطابقة اطيف المنحنيات بالمكتبة الطيفية 08 NIST .

تشخيص طيف الاشعة تحت الحمراء (FTIR) Infrared Spectroscopy :


اتبعت الطريقة التي ذكرها (2014) paucean *et al.* لتشخيص المجاميع الفعالة في يوغرت حليب الابقار والجاموس التي تضمنت تجفيد المنتج بجهاز التجفيد Freeze Dryer ومن خلط المنتج مع بروميد البوتاسيوم بنسبة ١:٥٠ ، ثم ضغط الخليط بالمكبس تحت ضغط ٢٥٠٠ كغم/سم^٢ للحصول على قرص قطره ١ سم وسمكه ٢ ملم . وضع النموذج المكبوس في جهاز الاشعة تحت الحمراء المجهز من شركة Jasco اليابانية التابع لمركز ابحاث البوليمر / جامعة البصرة ،

التحليل الاحصائي : استعملت تجربة عاملية ذات عاملين باستخدام التصميم العشوائي الكامل (C.R.D.) وتمت المقارنة بين متوسطات المعاملات باستخدام اقل فرق معنوي المعدل (L.S.D.) عند مستوى معنوية ٠.٠١ وباستخدام برنامج التحليل الاحصائي (SPSS(2012) في تحليل البيانات .

النتائج والمناقشة


قيم الاس الهيدروجيني والحموضة الكلية اثناء حضن اليوغرت :

يوضح الشكلان (١) و (٢) قيم الاس الهيدروجيني pH اثناء حضن اليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس ببادئات مختلفة ، اذ يتضح ان قيمة pH قد انخفضت بتقدم مدة الحضن وأن اقل قيمة كانت في اليوغرت المصنع ببادئ Y₄₅₀ ولجميع مدد الحضن باستثناء الوقت صفر الذي يمثل pH الحليب المستعمل بالتصنيع ، وبينت نتائج التحليل الاحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى P<0.01 بين اليوغرت المصنع ببادئ Y₄₅₀ وبقية انواع البادئات ولجميع مدد التصنيع عدا المدة ٢٤٠ دقيقة ليوغرت حليب الجاموس .




الحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية عند المستوى P<0.01 .

الشكل (١) : قيم الاس الهيدروجيني اثناء حضن اليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة




الشكل (٢): قيم الـ pH الهيدروجيني اثناء حضن اليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببادئات مختلفة

كما يوضح الشكلين (٣) و (٤) تطور الحموضة الكلية اثناء حضن اليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس ببادئات مختلفة واتضح زيادة قيم الحموضة الكلية بتقدم مدد الحضن وبينت نتائج التحليل الاحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى $P < 0.01$ لمدد الحضن المختلفة والانواع البادئات وتكون اليوغرت المصنع ببادئ Y450 معنويا ولكلا نوعي اليوغرت باستثناء المدة ٢٤٠ دقيقة ليوغرت حليب الجاموس . يرجع الانخفاض الحاصل في قيم الـ pH وزيادة قيم الحموضة الكلية بقدرة بكتريا البادئ على تحويل سكر اللاكتوز الى حامض اللاكتيك واحماض عضوية اخرى مما يخفض قيمة pKa داخل الخلية الى ٣.٨٣ مما يجعل غشاء الخلية اكثر نفاذية للمواد مثل اللاكتات والخلات مما يؤدي الى خفض قيمة pH وزيادة الحموضة الكلية لليوغرت (Yilmaz and Kurdal, 2014) .



الشكل (٣): تطور الحموضة الكلية اثناء حضن اليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة




الشكل (٤) : تطور الحموضة الكلية اثناء حضان اليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببائئات


اتضح احصائيا وجود علاقة ارتباط سالبة قوية بين تطور قيم pH والحموضة الكلية وبلغت قيمة معامل الارتباط في يوغرت حليب الابقار $R^2 = 0.944$ وفي اليوغرت المصنع من حليب الجاموس $R^2 = 0.980$ وهذا يعني ان مقدار الانخفاض في قيم pH توافق مع مقدار زيادة الحموضة الكلية .

قيم الاس الهيدروجيني والحموضة الكلية اثناء خزن اليوغرت :


يوضح الشكلان (٥) و (٦) قيم pH اثناء خزن اليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس ببائئات مختلفة ولمدة ٢١ يوما ، اذ يتضح انخفاض هذه القيم بتقدم مدد الخزن وأن اقل قيمة كانت ٤.١٢ بعد ٢١ يوما في اليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببائئ Y₄₅₀ الذي تفوق معنويا على يوغرت حليب الابقار المصنع ببقية البائئات ، في حين لم تلاحظ فروقات معنوية باستثناء اليوم الاول لخزن يوغرت حليب الجاموس . كما بين الشكلان (٧) و (٨) تطور الحموضة الكلية خلال خزن اليوغرت لمدة ٢١ يوما ، واتضح احصائيا ان تطور الحموضة الكلية معنويا بتقدم مدد الخزن للبائئات الاربعة وتفوق يوغرت حليب الابقار المصنع ببائئ Y₄₅₀ معنويا على بقية البائئات وبلغت اعلى قيمة ١.٥٢ بعد ٢١ يوما ، في حين لم تلاحظ فروقات معنوية بين يوغرت حليب الجاموس المصنع ببائئ Y₄₅₀ وبقية الانواع باستثناء اليوم الاول للخزن . كما بينت نتائج التحليل الاحصائي وجود علاقة ارتباط سالبة قوية بين الانخفاض الحاصل في قيم pH وبين الزيادة الحاصلة في قيم الحموضة الكلية وبلغ معامل الارتباط $R^2 = 0.917$.




الشكل (٥): قيم الاس الهيدروجيني لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة خلال مدد خزنية



الشكل (٦): قيم الاس الهيدروجيني لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببادئات مختلفة خلال مدد



الشكل (٧): الحموضة الكلية لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة خلال مدد خزنية مختلفة




الشكل (٨) : الحموضة الكلية لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببادئات مختلفة خلال مدد خزنية مختلفة

نضوح الشرش والنتروجين الكلي الذائب الكلي :


يوضح الشكلان (٩) و (١٠) النسبة المئوية لنضوح الشرش والشكلان (١١) و (١٢) النسبة المئوية للنتروجين الذائب /النتروجين الكلي لليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس ببادئات مختلفة وللمدد الخزنية (١ و ٧ و ١٤ و ٢١) يوما ، اذ يتضح من الاشكال الاربعة زيادة النسبة المئوية بتقدم مدد الخزن ، واتضح من نتائج التحليل الاحصائي ان مقدار الزيادة كانت معنوية بتقدم مدد الخزن وكذلك بين البادئات الاربعة ، الا ان اليوغرت المصنع ببادئ Y₄₅₀ تفوقا معنويا على بقية البادئات .

اتضح احصائيا وجود علاقة ارتباط موجبة بين مقدار النسبة المئوية للنضوح والنسبة المئوية للنتروجين الذائب /الكلي وبلغ معامل الارتباط في يوغرت حليب الابقار والجاموس $R^2 = 0.739$ و $R^2 = 0.737$ على التوالي ، مما يدل على ان النسبة الاعلى لتحرير النتروجين الذائب في اليوغرت يدل على نضوح اعلى من الشرش .


تعزى الزيادة الحاصلة في نضوح الشرش بتقدم مدد الخزن لزيادة مقدار الحموضة الكلية وخفض pH (Panesar and Shinde, 2011) . اما الزيادة الحاصلة في مقدار النتروجين الذائب فيرجع الى التحلل البروتيني Proteolysis الحاصل بفعل الانزيمات المحللة للبروتين Proteolytic Enzymes التي تفرزها بكتريا البادئ مسببة تحلل الكازينات الى ببتيدات وحموض امينية ومركبات نكهة ومركبات ذات اوزان جزيئية منخفضة في اليوغرت.




الشكل (٩) : النسبة المئوية لنضوح الشرش لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة وخلال مدد خزنية مختلفة



الشكل (١٠) : النسبة المئوية لنضوح الشرش لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة وخلال مدد خزنية مختلفة



الشكل (١١) : النسبة المئوية للنضوجين الذائب/النضوجين الكلي لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببادئات مختلفة وخلال مدد خزنية مختلفة




الشكل (١٢): النثروجين الذائب/النثروجين الكلي لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببدئات مختلفة لمدد خزنية مختلفة


المحتوى الكلي لحامض اللينوليك المقترن (CLA) : Conjugated Linoleic Acid

يوضح الشكلان (١٣) و (١٤) المحتوى الكلي لـ CLA في اليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس ببدئات مختلفة وللمدد الخزنية (١ و ٧ و ١٤ و ٢١) يوما. يتضح ان المحتوى الكلي قد ازداد في المراحل الاولى للتخزين ولغاية اليوم السابع ، ثم بدأ هذا المحتوى بالانخفاض بعد ١٤ و ٢١ يوما ولكلا نوعي الحليب عدا اليوغرت المصنع ببداءى Y₄₈₀ ، اذ استمرت الزيادة بعد ١٤ يوما من التخزين ، ثم بدأت بالانخفاض بعد ٢١ يوما من التخزين ، وبلغ اعلى محتوى ٣٤٥ و ٣٦٤ مايكروغرام/ غم في يوغرت حليب الابقار والجاموس المصنع ببداءى Y₄₈₀ بعد ١٤ يوما من التخزين ، بمعنى أن الزيادة بلغت (٢.٩٨ و ٣.٣٥) مرة ليوغرت حليب الابقار والجاموس على التوالي مقارنة بالحليب المصنع منهما .

عند المقارنة بين نوعي اليوغرت يتضح ان يوغرت حليب الجاموس الاعلى غزارة في محتواه من CLA مقارنة بيوغرت حليب الابقار وهذا قد يرجع لمحتوى الحليب من CLA ، اذ بلغ ١٠٣ و ١٢٢ ميكروغرام/غم حليب للابقار والجاموس على التوالي وكذلك المحتوى الاعلى لدهن حليب الجاموس . كما قد يعزى الارتفاع في محتوى اليوغرت من CLA في المراحل الاولى من الحضان لوفرة العناصر الغذائية ، اضافة لقدرتها على افراز انزيم Linoleic Acid Isomerase بكفاءة عالية والتي يعمل على تحويل حامض اللينوليك الى حامض اللينوليك المقترن CLA (Darani *et al.*, 2014) ، أما الانخفاض الحاصل في المراحل الاخيرة من الحضان فقد يرجع للارتفاع الحاصل في الحموضة الكلية للمنتج .



الشكل (١٣): تركيز CLA لليوغرت المصنع من حليب الابقار ببيادئات مختلفة لمدد خزنية مختلفة




الشكل (١٤): تركيز CLA لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببيادئات مختلفة لمدد خزنية مختلفة


الفعالية المضادة للاكسدة في اليوغرت :

يوضح الشكلان (١٥) و (١٦) الفعالية المضادة للاكسدة لليوغرت المصنع من الحليب الابقار والجاموس ببيادئات مختلفة ولمدد خزنية متنوعة ، يتضح زيادة الفعالية بتقدم مدد الخزن ولغاية ١٤ يوما ، ثم انخفضت هذه الزيادة بعد ٢١ يوما لكلا نوعي الحليب ، كما يتضح ان الفعالية المضادة للاكسدة في يوغرت حليب الجاموس اعلى مما هو عليه في يوغرت حليب الابقار وهذا قد يرجع الى محتواه من حامض اللينوليك المقترن CLA والذي اتضح من الشكلان (١٤) و (١٥) ، اذ تعد CLA من المركبات المضادة للاكسدة ومنها المركب β - Hydroxyacrolein عند تفاعلها مع الجذور الحرة لكل

من البيروكسيد والهيدروبيروكسيد ، اذ يعمل هذا المركب على ربط الحديد ومنع اكسدة اغشية الخلايا داخل الجسم (Ha *et al.*, 1990) .



الشكل (١٥): الفعالية المضادة للاكسدة لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببادئات مختلفة وخلال مدد خزنية مختلفة



الشكل (١٦): الفعالية المضادة للاكسدة لليوغرت المصنع من حليب الجاموس ببادئات مختلفة وخلال مدد خزنية

يتضح من نتائج التحليل الاحصائي تفوق البادئ Y₄₈₀ في فعاليته المضادة للاكسدة في يوغرت حليب الابقار والجاموس وبلغت أعلى فعالية (٦٢.٣ و ٦٨.١)% على التوالي بعد ١٤ يوما من الخزن . ان انخفاض الفعالية المضادة للاكسدة في المراحل الاخيرة من الخزن قد يرجع الى تفكك المركبات المضادة للاكسدة Dissociation of Antioxidant Compounds بسبب انخفاض الـ pH وبالتالي

تطور الحموضة للدرجة الموضحة في الاشكال ٥ و ٦ و ٧ و ٨ (Abd El-moneim *et al.*, 2012) . كذلك يمكن ان ترجع الفعالية المضادة للاكسدة في اليوغرت الى التحلل البروتيني Proteolysis الحاصل بفعل الانزيمات المحللة للبروتين التي تعمل على انتاج البيبتيدات ذات القدرة على تثبيط بيروكسيدات دهون الغذاء لمحتواها من الاحماض الأمينية His و Try و Met و Cys و Trp التي تمتلك فعالية مضادة للاكسدة عن طريق اقتناصها الجذور الحرة وتثبيط بيروكسيدات الدهون وربطها لايونات المعادن (Singh *et al.*, 2014) . كما اتضح من نتائج التحليل الاحصائي وجود علاقة ارتباط موجبة ضعيفة بين محتوى اليوغرت من CLA والفعالية المضادة للاكسدة وبلغ معامل الارتباط $R^2 = 0.602$ و $R^2 = 0.551$ في يوغرت حليب الابقار والجاموس على التوالي ، مما يدل على ان CLA ليست هي فقط المسؤولة عن فعالية المضادة للاكسدة وانما هنالك دور للبيبتيدات المتكونة من التحلل البروتيني كما ذكر اعلاه .

كما يتضح من الشكلان (١٥) و (١٦) ان الفعالية المضادة للاكسدة لحليب الابقار والجاموس والتي بلغت (١٢.٣ و ١٨.٧)% على التوالي الذي يعتبر الوقت صفر لمنتوج اليوغرت قد ترجع الى محتوى الحليب من فيتامين E وبروتين اللاكتوفيرين اللذان يعملان على ربط ايونات الحديد وكذلك وهب ذرة هيدروجين للجذور الحرة بالتالي تقلل من استمرار حصول الاكسدة الذاتية (Gjorgievski *et al.*, 2016) .

التقييم الحسي لليوغرت :

يوضح الجدول (١) نتائج التقييم الحسي لليوغرت المخزن لمدة ١٤ يوما والمصنع من حليب الابقار والجاموس بالبادئات Y_{480} و Y_{382} و Y_{382} و Y_{480} ، اتضح من النتائج التحليل الاحصائي تفوق يوغرت حليب الابقار المصنع بالبادئ Y_{480} بصفتي النكهة و القوام وبالصفات النكهة و الطعم والقبول العام ليوغرت حليب الجاموس معنويا عند المستوى $P < 0.01$ ، كما تفوق يوغرت حليب الجاموس معنويا على يوغرت حليب الابقار المصنع بالبادئ Y_{480} .

كما تميز يوغرت حليب الجاموس المصنع بهذا البادئ بلزوجة عالية High Viscosity وقوام سميك جدا Very Thick وطعم حامضي مثالي وقوام مطاطي Roby بشكل افضل من بقية النماذج ، اتفقت هذه النتائج مع (Hanif *et al.*, 2012) عند دراسته للصفات الريولوجية والحسية لليوغرت المصنع من حليب الابقار والجاموس الباكستاني المخزن لمدة ١٥ يوما .

ان تفوق اليوغرت المصنع ببداى Y₄₈₀ بصفة النكهة قد يرجع لقدرة بكتريا البادئ من انتاج مركبات النكهة مثل Diacetyl و Lactate و Citrate و Esters والتي تنتج من التحلل الحاصل لمكونات المنتج اثناء التخمر (Hanfi *et al.*, 2012) ، لاسيما المركبات الدهنية وهذا يفسر تفوق يوغرت حليب الجاموس لارتفاع محتواه الدهني مما انعكس على صفة الطعم والمظهر العام والقوام.

الجدول (١) : التقييم الحسي لليوغرت بعمر يوم واحد والمصنع ببادئات مختلفة من حليب الابقار

Y 382	Y 330	Y 480	Y 450	نوع البادئ الصفة
٣١.٢ ^c	٣١.٨ ^c	36.٠ ^a	33.2 ^b	النكهة (٤٠)
٢٤.٢ ^c	٢٣.٤ ^d	٢5.0 ^b	26.0 ^a	القوام (٣٠)
١٠.٢ ^b	١١.٤ ^a	١٢.٠ ^a	11.٦ ^a	الطعم (١٥)
١٠.٨ ^{ab}	١٠.٦ ^b	١١.٢ ^a	11.0 ^a	القبول العام (١٥)

- الحروف المختلفة تشير لوجود فروقات معنوية عند مستوى $P < 0.01$

الجدول (٢) : التقييم الحسي لليوغرت بعمر يوم واحد والمصنع ببادئات مختلفة من حليب الجاموس


Y 382	Y 330	Y 480	Y 450	نوع البادئ الصفة
٣٢.٢ ^c	٣٢.٢ ^c	٣٧.٢ ^a	٣٥.٤ ^b	النكهة (٤٠)
٢٢.٢ ^c	٢٤.٨ ^b	٢٦.2 ^a	٢٦.4 ^a	القوام (٣٠)
١١.٤ ^a	١١.٤ ^a	١٣.٠ ^a	١٢.٠ ^b	الطعم (١٥)
١١.٢ ^c	١١.٢ ^c	١٣.٢ ^a	١٢.٦ ^b	القبول العام (١٥)

- الحروف المختلفة تشير لوجود فروقات معنوية عند مستوى $P < 0.01$


التشخيص بتقنية FTIR :

يوضح الشكلان (١٧) و (١٨) طيف الاشعة تحت الحمراء ليوغرت حليب الابقار والجاموس بعمر ١٤ يوما والمصنع ببداى Y₄₈₀ ، اذ اتضح ظهور حزماتان عريضتان عند الطولين الموجيين ٣٤١٠ cm^{-1} و ٣٣٩٩ cm^{-1} لكلا النموذجين واللذان تعودان للاهتزاز الاتساعي لمجاميع الهيدروكسيل (OH) التي ادت لزيادة مجاميع الامايد (NH -) للاصرة البيبتيدية التي ظهرت بنفس المنطقة (Ramos *et al.*, 2013) ، كما ظهرت حزماتان صغيرتان عند الطولين الموجيين ٢٩٦٢ cm^{-1} و ٢٨٧٩ cm^{-1} واللذان تعودان للاهتزاز الاتساعي لمجاميع CH و CH₂ الاليفاتية ، كما ظهرت حزماتان عند الطولين الموجيين ١٦٥١ cm^{-1} و ١٦٥٣ cm^{-1} تعود للاهتزاز الاتساعي لمجاميع

الاماييد C = O (Wang *et al.*, 2010) . كما ظهرت حزمة عند الطول الموجي 1516 cm^{-1} بالنسبة لليوغرت المصنع من حليب الابقار والتي تعود لمجموعة الاماييد C - NH₂ (Ramos *et al.*, 2013) .



الشكل (17) : مرتسم طيف الاشعة تحت الحمراء ليوغرت حليب الابقار المصنع باستعمال البادئ Y₄₅₀



الشكل (18) : مرتسم طيف الاشعة تحت الحمراء ليوغرت حليب الجاموس المصنع باستعمال البادئ Y₄₅₀

توجد علاقة ارتباط وثيقة بين ظهور المجاميع الفعالة وبين المركبات الحيوية الفعالة الموجودة في اليوغرت المصنع ، ويمكن تلخيص هذه المركبات ومقدار امتصاصيتها التي تشير الى درجة تركيزها


في المنتج المصنع بالجدول (٣) ، اذ يتضح ارتفاع تركيز الاحماض الدهنية في نموذج اليوغرت المصنع من حليب الجاموس مقارنة باليوغرت المصنع من حليب الابقار ، كذلك ارتفاع تركيز مركبات النكهة Flavor Compounds والتي ترجع لفعالية بكتريا حامض اللاكتيك في البادئ المستعمل كذلك يتضح وجود مركبات الرائحة Aroma Compounds الناتجة من الفعل الانزيمي لبكتريا حامض اللاكتيك او من التحولات الكيميائية للاكتوز والدهون والبروتينات وحامض الستريك في اليوغرت (Cheng *et al.*, 2010) . يعد انتاج مركبات النكهة اثناء التحلل الدهني او اكسدة الاحماض الدهنية في دهن الحليب وهو المسار الرئيسي ، بينما يعد انتاج مركبات النكهة بفعل التحولات الميكروبية للاكتوز الى حامض اللاكتيك هو المسار الثانوي الذي ينتهي بتكوين مركبات الاستالديهايدات والاستايل الثنائي Diacetyl والاسيتون والايثانول (Paucean *et al.*, 2014) .

الجدول (٣) : اهم المركبات الحيوية وتركيزها في يوغرت حليب الابقار والجاموس


الامتصاصية (A. U.)		الاطوال الموجية (cm^{-1})	المركبات
يوغرت الجاموس	يوغرت الابقار		
٠.٢٥٩	٠.٢٧	٣٥٨ ، ٦١٣	الفوسفات
٠.٦٩٩	٠.١٩٣	١٠٨٠ ، ١٠٧٠	الكاربوهيدرات
٠.٥٨٥	٠.٣١٨	١٢٣٨ ، ١١٥٥	الاسترات
٠.٤٨١	٠.٣٩٨	١٤٥١ ، ١٣٢٢	الاسترات
٠.٤٥٥	-	١٤٢٢	الاسترات
٠.٥٨٥	٠.٥٢٢	١٥١٦ ، ١٦٥٣	حامض اللاكتيك
٠.٦٣٨	٠.٤٣١	٢٨٧٩ ، ٢٦٦٢	الاحماض الدهنية
٠.٩٢٠	٠.٥٥٢	٣٤١٠ ، ٣٣٩٩	الاحماض الامينية

تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية تقنية كروماتوغرافيا الغاز المتصل بمطياف الكتلة GC/MS :
توضح الاشكال (١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢) الاحماض الدهنية في دهن حليب الابقار والجاموس ودهن اليوغرت المصنع منهما ببادئ γ_{480} على التوالي ، اجريت عملية التشخيص للاحماض الدهنية في الحليب لغرض المقارنة مع الاحماض الدهنية في اليوغرت لملاحظة التغيرات الحاصلة بعد التصنيع ،


يتضح من هذه الاشكال وجود ٤٦ قمة لدهن حليب الابقار بينما ظهرت ٣٥ قمة لدهن اليوغرت المصنع منه ، بينما ظهرت ٤٠ قمة لدهن حليب الجاموس واعطى يوغرت حليب الجاموس ٥٠ قمة ، مما يدل على اختفاء بعض الاحماض الدهنية وظهور احماض دهنية جديدة في اليوغرت المصنع لم تكن موجودة اصلا في الحليب المستعمل للتصنيع .




الشكل (١٩): مرسم تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية GC-MS لدهن حليب الابقار



الشكل (20): مرتسم تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية GC-MS لدهن حليب الابقار



الشكل (٢١): مرسم تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية GC-MS لدهن يوغرت حليب الابقار



الشكل (٢٢): مرسم تشخيص الاحماض الدهنية بتقنية GC-MS لدهن يوغرت حليب الجاموس

ويمكن تلخيص نتائج المرسمات الاربعة السابقة الذكر بالجدول (٣) الذي يوضح النسب المئوية
 للاحماض الدهنية في حليب الابقار والجاموس واليوغرت المصنع منهما ، اذ يتضح من الجدول وجود
 احماض دهنية مشبعة Saturated Fatty Acid واحماض دهنية غير مشبعة Unsaturated Fatty
 Acid وكذلك احماض دهنية حلقة Cyclic Fatty Acid واحماض دهنية مثيلية Methylated

Fatty acid واحماض دهنية متفرعة Branch Fatty Acid ، واختلفت النسب المئوية في النماذج الاربعة ، اذ تميز نموذجي اليوغرت باحتوائها على نسب عالية من حامض اللينولييك المقترن Conjugated Linoleic Acid (CLA) بالاحص الحامض الدهني Methyl-Trans10 Cis12 Octadecadienoic الذي ازدادت نسبته من ١.٨٤% في حليب الابقار الى ٢.١٥% في اليوغرت المصنع منه بمعنى ان هذا الحامض ازداد بمقدار اكثر من ثلاث مرات في اليوغرت المصنع من حليب الجاموس ، وهذا الارتفاع ناتج من فعل انزيم Linoleic Acid Isomerase الذي مصدره بكتريا حامض اللاكتيك (Prandni *et al.*, 2011) . كذلك يلاحظ من الجدول ارتفاع النسبة المئوية للحامض الدهني المقترن Methyl Cis9 trans11 Octadecadienote من ١.٠٣% في دهن حليب الابقار الى ٣.١٢% في اليوغرت المصنع وارتفع من ١.٤٣% في دهن حليب الجاموس الى ٥.٦٧% في اليوغرت المصنع منه . هذه النتائج تعزز ما تم التوصل اليه عند قياس المحتوى الكلي لـ CLA لليوغرت والموضحة نتائجه في الشكلين (١٣ و ١٤) ، اذ تفوق يوغرت حليب الجاموس في محتواه مقارنة بيوغرت حليب الابقار. و للحامضيين الدهنيين المذكورين أعلاه اهمية بايولوجية لقدرتها على تثبيط بعض الاورام السرطانية من خلال عملها كمضادات اكسدة Antioxidants وكذلك قدرتها على تقليل مخاطر الاصابة بتصلب الشرايين Atherosclerosis (Park *et al.*, 2001) . كذلك وجد ان CLA دورا مهما في خفض مستوى الكلوكرز الدم لكونها تعمل على تقليل الاحماض الدهنية في الكبد والدهون والكليسيريدات الثلاثية وبالتالي تقلل من السمنة مما يسبب في تقليل مخاطر مرض السكر (Ryder *et al.*, 2001) .

الجدول (٤) : النسبة المئوية لمحتوى دهن حليب الابقار واليوغرت المصنع ببيادىء Y480

اسم الحامض الدهني	الصيغة التركيبية	حليب الابقار	يوغرت حليب الابقار	حليب الجاموس	يوغرت حليب الجاموس
Caproic acid	C6	0.53	0.68	0.37	0.55
Heptanoic acid	C7	٠.٤٨	1.25	0.42	1.52
Caprylic acid	C8	0.63	0.79	0.27	0.51
Capric acid	C10	2.37	1.84	0.72	1.18
Undecanoic acid	C11	0.06	0.03	0.08	0.06
Lauric acid	C12	3.81	2.57	1.31	1.93
Tridecanoic acid	C13	0.13	0.08	0.78	0.23
Myristic acid	C14	12.84	7.63	9.39	7.61
Pentadecanoic acid	C15	1.41	0.71	1.15	3.13

Palmitic acid	C16	38.03	19.28	33.35	19.00	
Margaric acid	C17	0.37	1.25	0.96	2.58	
Stearic acid	C18	6.46	11.78	14.26	13.83	
Nonadecanoic acid	C19	-	0.36	0.11	0.58	
Arachidic acid	C20	0.21	2.3	-	-	
22-Tricosenoic acid	C22	-	-	-	0.14	
Methyl 20-methyl-docosanoate	C23	-	-	-	0.4	
Tetracosanoic acid	C24	-	-	-	0.4	
Methyl 8-methyl-decanoate	C11 ↓	0.17	-	-	-	
Tridecanoic acid, 12-methyl	C14 ↓	0.52	0.14	0.78	0.23	
Methyl 12-methyl-tridecanoate	C14 ↓	0.09	0.49	-	-	
1,9-Cyclohexadecadiene, (E,E)	C16 △	-	6.37	-	-	
Methyl 15-methylhexadecanoate	C17 ↓	0.48	1.75	-	-	
Methyl 18-methylnonadecanoate	C20 ↓	-	0.91	-	-	
cis-5-Dodecenoic acid, methyl ester	C12 : 1	0.12	0.11	-	-	
Methyl Z-11-tetradecenoate ω -3	C14 : 1	0.06	0.43	-	-	
Methyl myristoleate ω -5	C14 : 1	1.35	2.00	0.3	0.5	
9-Hexadecenoic acid / Palmitoleic	C16 : 1	2.16	7.63	1.79	-	
11-Hexadecenoic acid	C16 : 1	1.37	-	-	-	
Methyl 9-heptadecenoate	C17 : 1	0.75	1.32	-	-	
Linoleic acid	C18 : 2	0.69	1.25	1.85	0.39	
Methyl 10-trans,12-cis-octadecadienoate	CLA	C18 : 2	1.84	2.15	1.32	4.65
Methyl 9-cis,11-trans-octadecadienoate		C18 : 2	1.03	2.12	1.43	5.67
Oleic acid	C18 : 1	14.6	15.84	26.09	22.52	
Nonadecenoic	C18 : 1	1.89	1.51	2.12	-	
cis-10-Nonadecenoic	C19 : 1	-	0.96	0.14	-	
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Eicosapentaenoic acid	C20 : 5	0.18	0.69	0.16	0.49	
Eicosatrienoic acid n 3	C20 : 3	-	0.5	-	-	
Methyl 11-eicosenoate : Gondoic acid	C20 : 1	0.20	0.3	0.17	1.47	
cis-7,10,13,16- Docosatetraenoic acid	C22 : 4	0.06	0.29	-	-	
Methyl 10,13,16-docosatrienoate	C22 : 3	0.13	0.08	-	-	
Ethyl 13-docosenoate	C23:1	-	-	-	0.32	
15-Tetracosenoic acid	C24:1	-	-	-	0.16	
Diethyl n-hexadecylmalonate	c8 △	0.17	-	-	-	

Adipic acid, cycloheptyl isobutyl ester	٢: ١٦٥	٠.٣٤	-	-	-
Cyclohexanecarboxylic acid	C11 △	1.63	-	-	-
1-Naphthalenesulfonic acid	C30 △	0.19	-	-	-
Cyclohexanecarboxylic acid	C17 △	0.55	-	-	-
Cyclopropaneoctanoic acid	C19 △	0.08	0.٧١	-	0.25
Cyclopentadecanone	C14 △	0.17	-	-	-
trans-13-Octadecenoic acid	C18 trans	0.34	-	-	-
Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate	C18:2	0.69	-	-	-
3-Cholesterol, 2-fromyl-3-benzyl	C34	-	-	-	٠.٣٦
l-(+)-Ascorbic acid 2,6-dihexadecanoate	C37:2	0.25	0.82	0.16	0.72
4-Decenoic acid	C10:1	0.22	0.08	-	-
cyclopenta[a]phenanthren-3-ol	C26 △	0.3	0.65	0.17	-

تدل العلامة (-) على أن الحامض الدهني غير موجود ، العلامة (+) تدل على أنه حامض دهني متفرع ، العلامة (△) تدل على أنه حامض دهني حلقي

ان النتائج المتعلقة بـ CLA في الجدول (٣) تتوافق مع النتائج المتحصل عليها في الشكلين (١٣ و ١٤) اللذان يوضحان زيادة المحتوى الكلي لـ CLA في اليوغرت مقارنة بالحليب المصنع منه بالأخص فيما يتعلق باليوغرت المصنع من حليب الجاموس ، كذلك يتضح من الجدول ارتفاع النسبة المئوية للحامض الدهني 1-(+) Ascorbic Acid -2,6- dihexadecanote في اليوغرت مقارنة بالحليب المصنع منه وهذا يعكس تأثيراً بايولوجياً لكون هذا الحامض يعمل كمضاد للاكسدة لاحتواءه على حامض الاسكوريك .

كما يلاحظ من الجدول ارتفاع النسبة المئوية للحامض الدهنية Heptanoic و Caproic Acid و Caprylic Acid في اليوغرت بشكل أكبر من الحليب المصنع منه وهذه الاحماض لها دور في اظهار النكهة المميزة للمنتج ، كذلك تسهم في سهولة عملية الهضم وبالتالي تزود الجسم بالطاقة مباشرة بدلاً من ان تخزن في الانسجة الدهنية (Mansson and Akesson, 2000)، كذلك يتضح ارتفاع نسبة الاحماض (W-3) Methyl -Z-11-Tetradecenote و (W-5) Methyl Miristoleate و (W-7) Palmitoleic والتي لها الدور الكبير في معالجة ارتفاع السكر في الدم وفي القضاء على الخلايا السرطانية وزيادة مناعة الجسم ومقاومة الامراض الالتهابية المزمنة بالإضافة لقدرتها على تسهيل التئام الجروح (Sales et al., 2013). كذلك اتضح ارتفاع الحامض الدهني (C₂₀:5) Cis5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic في اليوغرت مقارنة

بالحليب المصنع منه ولهذا الحامض الدور الكبير في موت الخلايا السرطانية بالاحص خلايا سرطان الغدد للمفاوية (Heimli *et al.*, 2003) .

الاستنتاجات:

١- امكانية تقييم نوعية اليوغرت المصنع بالاستعانة بالتقنيات الحديثة ومنها تقنية FTIR من خلال تشخيص المركبات الكيميائية ذات الفعالية البيولوجية لكونها طريقة اقتصادية ولا تحتاج لتحضير سابق للنماذج المفحوصة .

٢- امكانية تشخيص الاحماض الدهنية ذات الاهمية البيولوجية والاقتصادية والتصنيعية بتقنية GC-MS لكون هذه التقنية تشخص المركبات الموجودة في المنتج مهما كانت ضئيلة جدا ودون الحاجة لمركبات قياسية Standard compounds

٣- يعد اليوغرت المصنع من حليب الجاموس أكثر أهمية من يوغرت حليب الابقار ومن الحليب المصنع منه لكونه يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة ذات الاهمية الصحية والبيولوجية والتغذوية

References

- Abd El-moneim, M. R. ; Afify, M. R. ; Ramy, M. Sultan, I. M. and Hussein, M. M. (2012). Antioxidant activity and biological evaluations of probiotic bacteria strain . *Int. J. Aca. Res.*, 4(6): 131 – 139 .
- Arslan, S. and Bayrakc, S. (2016). Physicochemical functional and sensory properties of yoghurts containing persimmon. *Turkish J. of Agric. And forestry*, 40: 68 – 74 .
- Cheng, H. (2010). Volatile from compounds in yogurt. *critical reviews in food science and nutrition*, 50: 938 – 950 .
- Colakoglu, H. and Gursoy, O. (2011). Effect of lactic adjucted culture on conjugated linoleic acid concentration of yogurt . *J. Food Agric. And Envir.*, 9(1): 60 – 64 .

- Darani, K. K. ; Reihani, F. S. and Feili, R. (2014) . Bio-production of Conjugated Linoleic Acid in Yogurt by Probiotic Bacteria. ***J. Int. Biotechnol., 3: 62-68 .***
- Egan, H. ; Kirk, R. S. and Sawyer, R. (1988). Pearson Chemical Analysis of Foods. 8th ed. Bath press Aron., UK.
- Gjorgievski, N. ; Tomovska, J. ; Dimitrovska, G. Makarijoski, B. and Shariati, M. (2016). Determination of the antioxidant activity in yogurt . ***J. Hygienic Eng. and design, 15(2): 88 - 92 .***
- Ha, Y. L. ; Storkson, J. and Pariza, M. W. (1990). Inhibition of benzo[a]-pyrene-induced mouse fore stomach neoplasia by conjugated dienoic derivatives of linoleic acid. ***J. Cancer Res., 50: 1097-1101 .***
- Hanif, M. S. ; Zaboora, T. ; Iqbal, Z. and Arif, A. M. (2012). Effect of storage on rheological and sensory characteristics of cow and buffalo milk yogurt . ***Pak. J. Food Sci., 22(2) : 61 - 70 .***
- Heimli, H ; Hollung, K. and Drevan, C. (2003). Eicosapentaenoic acid – induced apoptosis depends on acyl CoA-Synthetase , ***Lipids: 38(3): 263 - 268 .***
- Lee, W. J. and Lucey, J.A. (2010). Formation and Physical Properties of Yogurt . ***J. Anim. Sci., 23(9): 1127 - 1136 .***
- Mansson, H. L. and Akesson, A. (2000). Antioxidative factors in milk. ***British J. Nutr., 84(1): 103 - 110 .***

- Panesar, P. S. and Shinde, C. (2011). Effect of Storage on syneresis, pH, *Lactobacillus acidophilus* count , *Bifidobacterium bifidum* count of Aloe vera fortified probiotic yogurt . ***current Res.in dairy Sci., 12(2): 1 – 7 .***
- Park , Y.W.(2001).Proteolysis and Lipolysis of goat milk cheese .The American Dairy Science Association , Vol. 84 , E. Suppl.
- Paucean, A. ; Vodnar,D. ; Socacin, C. and Man, S. (2014). Monitoring the evaluation of major chemical compound in dairy products during shelf life by FTIR . ***Bulletin UASVM food Sci. and Technol., 7(2): 136 – 141 .***
- Prandini, A. ; Sigolo, S. and Piva, G. (2011). A comparative study of fatty acid composition and CLA concentration in commercial cheese . ***J. Food Com. Ana., 24: 55 – 61 .***
- Ramos, O. L. ; Silva , S.i> ; Soures, J. C. ; Fernandes, J. C. ; Cerqueira, M. A. ; Pereira, R. N. ; Vicente, A. A. ; Pocas, M. F. ; Pintado, M. E. and Malcata, F. X. (2013). Effect of whey protein purity and glycerol content upon physical properties of edible films manufactured therefrom. ***Food Hydrocolloids, 30: 110–122 .***
- Rodrigues, L. M. ; Braga, T; Malcata, F. X. ; Gomes, A. and Fontecha, J. (2010). Quantitative and qualitative determination of CLA production *Bifidobacterium* and lactic acid bacteria by combining spectrophotometric and Ag⁺ – HPLC techniques . ***Food Chem., 125: 1272 – 1378 .***
- Ryder, I. W. ; Porto–CArrero, C. P. ; Song, X. M. ; Cui, L. ; Yu, M. ; Combatsiaris, T. ; Galuska, D. ; Bauman, D. E. ; Barbano, D. M. ;

- Charron, M. I. ; Zierath, I. R. and Houseknecht, K. L. (2001). Isomer specific antidiuretic properties of conjugated linoleic acid : Improved glucose tolerance, skeletal muscle insulin action and UCP-2 gene expression . *J. Am. Diabetes Assoc.*, **50**: 1149 – 1157 .
- Sales, H. S. ; Peghini, P. R. ; Silva, D. M. and Cardoso, C. R. (2013). An overview of the modulatory effects of oleic acid in health and disease, **Mini. Rev. Med. Chem.**, **13**(2): 201 – 210 .
- Serafeimidou, A. ; Ziatanos, S. ; Laskarid, S. K. and Saqredos, A. (2012). Chemical characteristics, fatty acid composition and conjugated linoleic acid content of traditional Greek yogurts. **Food chem.**, **134**(4): 1839 – 1846.
- Sezen, D. (2012). Chemical and Rheological Properties of Yoghurt Produced by Lactic Acid Cultures Isolated from Traditional Turkish Yoghurt . *M. Sci. Middle east technical University* , Turkish, Pp: 139 .
- Singh, B. P. ; Vij, S. and Hati, S. (2014). Functional Significance of bioactive peptides derived from soybean. *J. Homopage*, **54**: 71 – 179.
- SPSS (2012). Statistical packages of social sciences. Version (21). USA .
- Uaboi-Egbenni¹, P. O. ; Okolie, P. N. ; Akintunde ,T. I. ; Bisi-Johnson, O. ; Enwe, L. and Bessong, P. O.(2010). Proximate analysis and microbiological quality of cheese produced from raw cow milk obtained from fulani settlement in ogun state nigeria, using lactic acid bacteria and extract from sodom apple leaf (*Calotropis procera*) .*Pakistan J. Nutr.*, **9**(9): 920–925.

Yilmaz, L. and Kurdal, E. (2014). The production of set type–bio–yoghurt with commercial probiotic culture . *Inter. J. Chem. Eng. Appl.*, 5(5): 402 – 408.

Quality Assessment of Yogurt Prepared from Cow and Buffalo Milk Using Different Commercial Starters

Ali Khudhair Jabir Alrikabi

Department of Food Science, College of Agriculture
University of Basrah.

Abstract

Yogurt prepared from cow and buffalo milk using different commercial starters (Y450, Y480, Y330 and Y382). The quality of prepared yogurt evaluated using pH and titrable acidity during 240 minute and 21 days of incubation period and storage time of yogurt, respectively. The results showed that the yogurt prepared from Y450 starter has gave lower value of pH and higher value of titrable acidity during incubation period and storage time. The starter (Y450) was gave higher percentage of whey synthesis and soluble nitrogen / total nitrogen compared with the other starters. The prepared yogurt from Y480 has higher content of CLA and antioxidant activity. Also, sensory evaluation results (flavour, texture, taste and appearance) were better compared with the other starters. Many biologically active compounds which showed their biological activity in prepared yogurt were identified using FTIR technique. The present fatty acids were identified by GC-MS. This result indicated that prepared yogurt from Y480 starter contains higher amount of fatty acids than the used milk.

Key words : yoghurt , Quality Assessment , Cow and Buffalo milk , Commercial Starters