

تأثير أضافة الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية على الحاصل ومكوناته

لمحصول الذرة الصفراء *Zea mays L.*

كاظم كطامي الاسدي

خولة داود كاطع

جامعة البصرة - كلية الزراعة

قسم المحاصيل الحقلية

الخلاصة

أجريت دراسة حقلية في محطة الهاشة للأبحاث الزراعية التابعة إلى كلية الزراعة -جامعة البصرة خلال الموسم الخريفي لعام 2012 لمعرفة تأثير كل من سمادي النيوريا (N %46) والسوبر فوسفات الخماسي (P %42) في صفات وحاصل ومكونات محصول الذرة الصفراء هجين (3001) زرعت التجربة بتاريخ 1 / 8 / 2012، استخدم ثلاثة مستويات من النتروجين (100، 200، 300) كغم $N\text{--H}_2\text{O}$ ¹ وأربع مستويات من الفسفور ب الهيئة سوبر فوسفات الخماسي (40، 50، 60، 70) كغم $P\text{--H}_2\text{O}$ ¹.

اعطت المعاملة السمادية N3 أعلى متوسط لحاصل النبات الواحد بلغ (145.95) غم، اعطت المعاملة السمادية P2 أعلى متوسط لحاصل النبات الواحد بلغ (154.17) غم.

طبقت التجربة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بأسلوب القطع المنشقة لمرة واحدة وبثلاث مكررات اظهرت نتائج الدراسة ان كلا السمادين اثراً معنوياً في صفات [ارتفاع النبات (سم)، دليل المساحة الورقية ، الوزن الجاف (غم) ، وزن 500 حبة (غم) ، وحاصل النبات الفردي (غم)]، كما اثر التداخل وبصورة معنوية على الصفات المذكورة أعلاه.

المقدمة

أن التوسيع الحاصل في زراعة المحاصيل الحقلية وزيادة الطلب عليها دفع الباحثين إلى دراسة كافة العوامل المؤثرة في زيادة الإنتاجية كماً ونوعاً، ومن المعروف أن الأسمدة الكيميائية بصورة عامة والنتروجينية والفوسفاتية بصورة خاصة من العوامل المهمة والمحددة لمستوى إنتاجية وحدة المساحة، وأهمية هذه الأسمدة تزداد في ظروف العراق المناخية كما أن الترب تفتقر إلى المواد العضوية وكما معروف أن الأسمدة الكيميائية وخاصة النتروجينية منها سريعة الفقد من التربة لذا توجب معرفة محتوى التربة من العناصر الضرورية ومقدار احتياج المحاصيل بالإضافة كميات محددة من الأسمدة ، وبالرغم من أن هذه الأسمدة تزيد إنتاجية المحصول إلا أنها تعتبر سلاح ذو حدين ويجب التقييد بالكميات المناسبة إذ أن الزيادة والنقصان تتعكس سلباً على النبات وبالتالي على الإنتاجية(ولي واخرون ،1985).أن زيادة الأسمدة النتروجينية (-0-360 كغم N ه⁻¹) تؤدي إلى زيادة ارتفاع النبات حيث وجد جلو واخرون (2005) ومالح (1986) أن للسماد النتروجيني تأثيراً معنوياً في زيادة ارتفاع النبات ، وبتأثير السماد النتروجيني على قطر الساق فقد وجد شوبيلية (2000)إلى أن زيادة معدل السماد النتروجيني بمعدل أكثر من (200) كغم N ه⁻¹ إلى زيادة معنوية في معدل قطر الساق ولم يجد مالح (1986) أي تأثير معنوي لإضافة السماد الفوسفاتي على قطر الساق حيث لاحظ حدوث زيادة لكنها لم تصل إلى مستوى المعنوية ،وتؤثر الأسمدة النتروجينية على المساحة الورقية ودليل المساحة الورقية إذ أشار شوبيلية(2000) والحديثي (2011) إلى ان زيادة مستويات السماد النتروجيني تؤدي إلى زيادة معنوية في دليل المساحة الورقية ، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة السماد النتروجيني يؤدي إلى حدوث زيادة معنوية في الحاصل ومكوناته وهذا ما أشار إليه كل من(ولي وأخرون ،1985 ،والدليمي (2006) وجلو واخرون(2005) وشوبيلية، 2000 وعلوان،2002) وذكر مالح (1986) وابوضاحي(2010) إلى أن زيادة مستويات السماد الفوسفاتي أدت إلى حدوث زيادة معنوية في عدد الصفوف/عرنوص وعدد الحبوب /صف وعدد الحبوب/عرنوص وزن 500 جبة(غم) والحاصل النهائي للحبوب عند مستوى سمادي (-60) Harlin et.al(2005) and (2005) Kغم P₂O₅ ه⁻¹. وأشار الكثير من الباحثين (ابو ضاحي والتيمي، 2005) (Uchida(2000) ان عملية تغذية المحصول بالعناصر المغذية من اهم العوامل المساعدة في زيادة الانتاج في وحدة المساحة لاسيما مع عنصر الفسفور لما له من اهمية كبيرة في زيادة حاصل حبوب الذرة الصفراء وتحسين نوعيتها لما يؤديه من وظائف مهمة داخل النبات عند تداخله مع عنصر النتروجين.

وعليه جاءت هذه الدراسة بهدف معرفة وتحديد افضل مستوى من السماد النتروجيني وافضل مستوى من السماد الفوسفاتي ومعرفة تأثير التداخل فيما بينهما والذي يعطي افضل حاصل في ظروف ترب البصرة.

المواد وطرق العمل

طبقت التجربة خلال الموسم الخريفي لعام 2012 في محطة الهاشة للأبحاث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة البصرة ،لتحديد أفضل مستوى سماد نتروجيني وأفضل مستوى فوسفاتي ،واخذت نماذج من تربة الحقل وتم تحليتها بعد خلطها واخذ نموذج ممثل لها. استخدمت ثلاثة مستويات سمية من النتروجين على هيئة يوريما (N %46) (N₁، N₂، N₃) (ضايف ،1984) وأربع مستويات سمية فسفاتية على هيئة سوبر فوسفات الخماسي (P₂O₅ %42) (P₁، P₂، P₃، P₄) واشير لها بـ (70، 40، 50، 60) كغم هـ⁻¹ . وأضيفت الأسمدة على دفتين الأولى عند الزراعة وشملت السماد الفوسفاتي ونصف كمية السماد النتروجيني والدفعة الثانية من السماد النتروجيني بعد مرور شهر من الزراعة ،استخدم الهجين (باء 3001) المعتمد ،نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبثلاث مكررات وزاعت المعاملات وفق أسلوب القطع المنشقة شملت القطع الرئيسية على معاملة التسميد النتروجيني والقطع الثانوية شملت معاملة السماد الفوسفاتي .احتوت الوحدة التجريبية على ثلات مروز طول المرز 5 م والممسافة بين مرز آخر 0.75 م وفصلت الألواح عن بعضها بمسافة 0.5 م ،تمت الزراعة بموعدها 8/8/2012 أجريت كافة العمليات الزراعية المتعلقة بخدمة المحصول .تمت دراسة مجموعة من

الصفات :

ارتفاع النبات (سم) ، قطر الساق (ملم) ، دليل المساحة الورقية ، الوزن الجاف (غم) ، وحسبت مكونات الحاصل (عدد العرانيص /نبات ، عدد الحبوب /صف ، عدد الحبوب /العنوص ، وزن 500 حبة (غم) وحاصل الحبوب للنبات الفردي . حللت البيانات إحصائيا وتمت مقارنة المتوسطات باستخدام اقل فرق معنوي معدل (الراوي وخلف الله، 1980).

جدول(1) بعض الصفات الكيميائية و PH التربة الموقعة للموسم الخريفي 2002

P%	N%	Ec	PH	نسبة التربة	الموقع
4.045	0.18	10.5	7.8	غرينية طينية	الهاشة

النتائج والمناقشة

1- ارتفاع النبات (سم)

تشير نتائج الجدول (2) إلى وجود فروقات عالية المعنوية لإضافة السماد النتروجيني إذ أعطى المستويين (N3,N2) أعلى معدل لارتفاع النبات بلغ 145.85 و 158.61 سم على التوالي مقارنة بالمستوى الأول (N1) (120.02) سم وهذا يتفق مع ما توصل إليه الدليمي (2006) وجلو وآخرون (2005)، أعطى المستوى الثالث من السماد الفوسفاتي P3 أعلى معدل لارتفاع النبات (148,13) سم مقارنة بالمستوى الأول P1 الذي أعطى أقل معدل لارتفاع النبات (135.11) سم وقد يرجع سبب زيادة ارتفاع النبات بإضافة السماد الفوسفاتي إلى توفر الفسفور الجاهز لامتصاص النبات في التربة ونمو الجذور وزيادة مساحتها السفلية مما شجع على زيادة امتصاص الفسفور والعناصر الضرورية الأخرى مع رفع كفاءة عملية البناء الضوئي وبالتالي زاد ارتفاع النبات والنمو الخضري بشكل عام هذا انفق مع ما توصل إليه أبوظاهي والتيميمي (2005). وتشير نتائج الجدول (3) إلى أن التداخل كان معنوياً بين السماد النتروجيني والفوسفاتي فقد أعطت التوليفة (N3xP3) أعلى معدل لارتفاع النبات (170.93) سم مقارنة بالتوليفة (N1 xP1) والتي أعطت أقل معدل لارتفاع النبات (107.66) سم وهذا يدل على أن العوامل مشتركة قد سلكت سلوكية متداخلة تدخل إيجابياً إلى تحسين صفات النبات. وانفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من Harlin et.al(2005),

Uchida(2000)

2- قطر الساق (ملم)

لم تظهر نتائج الجدول (2) و (3) أي فروقات معنوية لصفة قطر الساق بالنسبة للمعاملات المفردة والممتداخلة.

3- دليل المساحة الورقية

لم تظهر فروقات معنوية لهذه الصفة بالنسبة للعوامل المفردة جدول (2)، في حين أعطى التداخل فروقات معنوية قد أعطت التوليفة (N2 xP3) أعلى معدل بلغ 1.69 مقارنة بالتوليفة (N1 xP4) والتي أعطت أقل معدل لهذه الصفة . وهذا يتفق مع مالح، (1986) و (Uchida, 2000) (1.03)

4- الوزن الجاف (غم)

تبين نتائج جدول (2) وجود فروقات عالية المعنوية فقد أعطى المستويين (N3, N2) أعلى معدل للوزن الجاف 158.55 و 126.78 (غم) مقارنة بالمستوى N1 الذي أعطى أقل معدل (93.23) غم كما أعطى السماد الفوسفاتي قيم

عالية المعنوية فقد أعطى المستوى P1 أعلى معدل لهذه الصفة مسجلاً (142.03) غم مقاربة بالمستوى P3 الذي أعطى أقل معدل (113.08) غم . واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه ابوضاحي والتيمي (2010) اللذان وجدا بان وزن المادة الجافة يزداد بزيادة التسميد الفوسفاتي. أما جدول (3) فيظهر الفروقات المعنوية العالية للتدخل بين العاملين فقد أعطت التوليفة (N1 xP3) أعلى معدل لهذه الصفة (187.93)غم مقارنة بالتوليفة (N1 xP4) التي أعطت أقل معدل لهذه الصفة بلغ (87.82)غم.

5- عدد العارنيص /نبات وعدد الحبوب /صف وعدد الصفوف /العنوص
نتائج جدول (2) و(3) تشير إلى عدم وجود فروقات معنوية لهذه الصفة بالنسبة للعوامل المفردة والمتداخلة وهذا يتفق مع ما توصل إليه (جلو واخرون،2005) ولبي وأخرون ،(1985).

6- وزن 500 حبة (غم)
تشير نتائج جدول (2) إلى وجود فروقات عالية المعنوية لهذه الصفة إذ أعطى المستوى N2 أعلى معدل لهذه الصفة (81.85) غم مقارنة بالمستوى N1 الذي أعطى اقل معدل (63.17)غم وهذا يتفق مع ما توصل إليه (مالح 1986، و salama et al 1994 ، 1994) وقد يرجع سبب ذلك إلى أن التسميد النتروجيني يزيد من كفاءة التمثيل الضوئي نتيجة لزيادة النمو الخضري والجزي الامرالي الذي يؤدي إلى زيادة تراكم المواد الجافة (ولي واخرون ، 1985) . أظهرت مستويات التسميد الفوسفاتي فروقات عالية المعنوية جدول (2) فقد أعطى المستوى P4 أعلى معدل لوزن 500 حبة (77.46) غم مقارنة بالمستوى P2 الذي أعطى اقل معدل (66.95)غم أن إضافة السماد الفوسفاتي يسرع من نطور النبات وهذا يؤدي إلى زيادة معدل التمثيل الضوئي وعملية انتقال المواد الغذائية مما يؤدي إلى زيادة وزن الحبوب المحتوية على كمية قليلة من الرطوبة عند الحصاد ابوضاحي والتيمي (2005). كما اظهر التداخل جدول(3) فروقات عالية المعنوية فقد أعطت التوليفة (N2P2) أعلى معدل لوزن 500 حبة (98.75)غم مقارنة بالتوليفة (N3P2) التي أعطت اقل معدل لهذه غم وهذه النتيجة تتفق مع (مالح ، 1986 ، 56.45).

جدول(3) يظهر التأثير المعنوي للتدخل بين السمادين إذ أعطت التوليفة (N2P4) أعلى معدل بلغ (98.75) غم مقارنة بالتوليفة (N3P2) التي أعطت اقل معدل (56.45)غم، أن زيادة وزن 500 حبة بإضافة عدة تدخلات من السمادين النتروجيني والفوسفاتي قد ترجع إلى أن السماد أدى إلى زيادة نمو وانتشار المجموع الجذري مما أدى إلى زيادة امتصاص

العناصر الغذائية وتحسين كفاءة عملية التمثيل الضوئي وبالتالي زيادة تراكم المادة الجافة في الحبوب مؤدياً إلى زيادة وزنها.

7- حاصل النبات الفردي (غم)

نتائج جدول (2) تشير إلى وجود فروقات معنوية لإضافة السماد النتروجيني فقد أعطى المستوى N3 أعلى معدل لحاصل النبات الفردي (145.95)غم مقارنة بالمستوى N2 الذي أعطى اقل معدل (123.85)غم وهذا يتفق مع ما توصل إليه الدليمي(2006) و جلو واخرون(2005) وقد يرجع سبب ذلك إلى حدوث زيادة في معدل وزن الحبة مما ينعكس إيجاباً على الحاصل . ولم تعطي نتائج إضافة السماد الفوسفاتي أي فروقات معنوية جدول (2). بينما أعطى التداخل بين السمادين فروقات عالية المعنوية إذ أعطت التوليفة (N3 xP1) أعلى معدل لهذه الصفة (175.06)غم مقارنة بالتوليفة (N1 xP1) التي أعطت اقل معدل (78.10)غم وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه مالح(1986) و (Harlin,et.al,2005 , Uchida,2000)

المصادر

- ابوضاحي، يوسف محمد وعلي جاسم هادي التميمي 2010. دور اضافة الفسفور الى التربة والرش في نمو وحاصل الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية.41(2):117-125.
- الأنصاري ، مجید محسن 1982. إنتاج المحاصيل الحقلية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة بغداد.
- الحديثي، اكرم عبداللطيف ونایف محمود فياض،2011. تأثير التسميد النتروجيني والرش بالزنك في نمو وحاصل الذرة الصفراء. مجلة الانبار للعلوم الزراعية، مجلد 9 العدد1: 75-84.
- الدليمي، اسماعيل محسن(2006) : تأثير التسميد النتروجيني في نمو وحاصل الذرة الصفراء *Zea Mays*. مجلة الانبار للعلوم الزراعية، المجلد: 4 العدد (1)
- الراوي، خاشع محمود الراوي وعبد العزيز محمد خلف الله 1980. تصميم وتحليل التجارب الزراعية.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -جامعة الموصل.
- العلوان، عبد السلام غضبان 2002.تأثير التسميد النتروجيني والمسافات بين الجور على الحاصل ومكوناته في محصول الذرة الصفراء *Zea mays L*. تحت ظروف محافظة البصرة. مجلة البصرة للعلوم الزراعية .المجلد 15 العدد 1: 103-114.
- جلو، رياض عبد الجليل، محمد محمد مسعد وسناء عبدالجبار يوسف.2005. التداخل بين مستويات النيتروجين ومواعيد اضافة وتأثيره في حاصل الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية.36(1): 69-74.
- شويلية، ليث حسان 2000. تأثير الكثافة النباتية وطريقة توزيعها ومستويات النيتروجين في حاصل الذرة الصفراء *Zea Mays L*. رسالة ماجستير كلية الزراعة - جامعة بغداد.
- ضاييف، عبد الأمير مزعل 1984.تأثير الكثافة النباتية على صفات بعض المهجن والأصناف التركيبية مختلفة النضح في الذرة الصفراء.مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية .المجلد 3 العدد 1 : 37-46 .
- مالح ،كامل مطشر 1986. تأثير بعض مستويات التسميد النتروجيني والفوسفاتي على حاصل ونوعية حبوب الذرة الصفراء *Zea mays L*. رسالة ماجستير كلية الزراعة- جامعة صلاح الدين.
- ولي ،صدر الدين بهاء الدين محمد واحمد عبد الحسن وخالد عبد اللطيف وهب 1985.تأثير التسميد النتروجيني ومسافات الزراعة على نمو وحاصل الذرة الصفراء.المجلة العراقية للعلوم الزراعية -زانكتو - العدد 3:109-123.
- Anderson, B.E.L.,E.J.K. Kamprath & R.H.Moll,1984.Nitrogen fertility effect on accumulation remobilization and partitioning of nitrogen and dry matter in corn genotypes differing prolificacy.Agron.J.76 : 397-404.
- Harlin, J.L., J.D. Beaton, S.L. Tisdale and W.L. Nelson.2005. Soil Fertilizers. 7thed. An Introduction to Nutrient Management. Upper Saddle River. New Jersey .Pp515.
- Salama , F.A.,H.El-magda ,A.Sh.Gada,& S.E.Sadek,1994.Correlation and path coefficient analysis in eight white Maize (*Zea mays L.*) hybrid characters .Menofiya.J.Agric Res. 19:3009-3020.
- Uchida. R.2000. Essential nutrients for plant growth: Nutrient Functions and deficiency symptoms. Plant nutrient management in Hawaii soils 3:31-35.

جدول رقم (2) تأثير الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية على الحاصل ومكوناته لمحصول الذرة الصفراء

حاصل النبات الفردي (غم)	وزن 500 حبة (غم)	وزن 500 حبة (غم) / الصف	عدد الحبوب / العنوص	عدد الصفوف /النبات	عدد العرانيص /النبات	الوزن الجاف (غم)	L.A.I	قطر الساق (ملم)	ارتفاع النبات (سم)	الصنف
142.74	63.17	33.66	16.21	1.35	93.23	1.28	12.33	120.02	N1	
123.85	81.85	35.82	16.38	1.66	158.55	1.53	11.91	145.85	N2	
145.95	75.81	33.77	15.68	1.55	126.78	1.41	13.16	158.61	N3	
4.7	0.16	n.s.	n.s.	n.s.	7.4	n.s.	n.s.	9.1	L.S.D.	
129.98	76.85	35.24	16.21	1.55	142.03	1.38	11.33	135.11	P1	
154.17	66.95	34.84	16.12	1.48	113.13	1.37	13.55	141.55	P2	
137.34	73.18	34.24	15.88	1.51	113.08	1.47	12.77	148.13	P3	
128.58	77.46	33.33	16.15	1.53	130.50	1.14	12.22	141.19	P4	
6.05	6.75	n.s.	n.s.	n.s.	6.05	n.s.	n.s.	8.002	L.S.D.	

n.s تعني عدم وجود فروق معنوية

جدول رقم(3) تأثير الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والتداخل بينهما على الحاصل ومكوناته لمحصول الذرة الصفراء

الصنف	ارتفاع النبات (سم)	قطر الساق (ملم)	L.A.I	الوزن الجاف (غم)	عدد العرانيص / النبات	عدد الصنوف / العرنوص	عدد الحبوب / الصنف	وزن حبة (غم)	حاصل النبات الفردي (غم)
N1	107.66	11.33	1.41	150.60	1.33	16.13	30.57	60.80	78.10
	130.13	12.66	1.44	144.64	1.46	16.05	32.37	67.60	102.23
	126.13	14.66	1.25	187.93	1.40	16.55	37.03	65.65	112.63
	116.18	10.66	1.03	87.82	1.20	16.10	34.66	58.65	79.97
N2	147.40	11.33	1.43	117.25	1.66	16.44	39.25	81.7	172.93
	150.40	11.66	1.46	144.26	1.73	15.99	36.44	76.8	154.53
	147.33	12.66	1.69	109.10	1.66	16.22	34.01	70.15	128.10
	138.26	12.00	1.53	124.82	1.60	16.88	33.86	98.75	178.63
N3	150.26	11.33	1.30	122.11	1.66	16.05	35.91	88.05	175.06
	144.13	16.33	1.20	173.61	1.26	16.33	35.73	56.45	82.63
	170.93	11.00	1.46	114.99	1.46	14.88	31.69	83.75	132.90
	169.13	14.00	1.66	173.10	1.80	15.47	31.75	75.00	132.90
	14.05	n.s	0.39	11.49	n.s	n.s	n.s	10.98	46.1
	L.S.D.								

n.s تعني عدم وجود فروقات معنوية

..... مجله المثنى للعلوم الزراعية / المجلة : 3 / العدد: 2 / 2015

Effect application of Nitrogen & phosphor fertilizers on yield & yield components of maize *Zea Mays L.*

Khawla Dawood Gatie

Kadem Kidami Al-Asady

**Basra University - Agriculture College
Agronomy Department**

Summery

Field experiment were connected in Hartha experiment station –agriculture college – Basra university during the fall 2012 growing season to study effects of Urea(46% N) & super phosphate (P_2O_5 42% P) fertilizers on characteristics yield & components of *Zea Mays L.*(hybrid 3001) the experiment held in 1/8/2012 .use three levels of nitrogen {urea} (100 , 200 , 300) Kg /ha and four levels of phosphor (40 ,50, 60,70) Kg /ha .the experimental design was R.C.B.D and the treatments were in split – plot arrangement with three replicates .the results showed that there was significant grain yield among two fertilizers in the same time the fertilizers effect on plant heights ,L.A.I , and weight of 500 grain (gm) and grain yield (gm).the interaction was significant effect .