

# فسلجة مقاومة الشد البيئي في النباتات

## Physiology of stress tolerance in plants

### References:

- ❖ **PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF STRESS TOLERANCE IN PLANTS**  
*Edited by: K.V. MADHAVA RAO; A.S. RAGHADeVENDRA/ University of Hyderabad, India and K. JANARDHAN REDDY; Osmania University, India ; Andhra University, India*
- ❖ **RESPONSE OF PLANTSTO ENVIRONEMENT AL STRESSES**  
*Edited by: J. LEVIT , Department of plant Biology, Carnegie Institution of Washington Stanford, CLIFORNIA*
- ❖ الماء في حياة النبات / تأليف الدكتور رياض عبد الليف احمد
- ❖ فسلجة الحاصلات الزراعية ونموها تحت الظروف الجافة/ تأليف رياض عبد اللطيف احمد
- ❖ **Heavy Metal Stress in Plants From Molecules to Ecosystems**  
*Edited by: M.N.V. Prasad· J. Hagemeyer*

# الجفاف Water or Drought stress

## أسباب حدوث الجفاف

يحدث الجفاف عند ارتفاع درجات الحرارة وقلّة التساقط مما يؤدي بالنتيجة الى انخفاض نسبة الماء الجاهز في التربة عن الحد الطبيعي الملائم لنمو النبات وفقدان في الماء بسبب عملية النتح والتبخّر بالتالي تحتاج النباتات الى نظام جذري وخطري فعال لمقاومة الجفاف.



**ضمن ظروف الحقل فان الشد المائي يحدث بسبب واحد او اكثر من الاسباب التالية:**

- 1- قلة ماء التربة (قلة الجهد المائي لمحلول التربة )
- 2- انخفاض درجة حرارة التربة او انجماد التربة مما يسبب قلة دخول الماء وعدم كفايته في سد احتياج النبات
- 3- سوء تهوية الجذور وقلة قابليتها على امتصاص الماء والعناصر الغذائية
- 4-زيادة سرعة النتح عن سرعة الامتصاص حتى عند توفر الظروف في النقاط المذكورة في اعلاه


**يحدث الجفاف عندما تكون كمية الماء الممتصة من الجذر اقل من كمية الماء المفقودة عن طريق عملية التبخّر والنتح**



# الاحساس بالجفاف Sensing Drying Environments

Water stress

بمجرد احساس النبات بجفاف الهواء المحيط حتى وان كانت هناك كميات كافية من الماء في التربة يقوم النبات بغلق الثغور والذي يؤدي بالنتيجة الى حدوث اكبر أرباك للفعاليات الحيوية في النبات.



ما هو الهرمون المسؤول عن عملية فتح وغلق الثغور؟

1- abscisic aldehyde oxidase (ABA)

2- اضافة الى اربعة انزيمات موجودة في الورقة

ان موقع المستلم للاحساس بالجفاف موجود في الخلايا الحارسة

Growth adjustment and stress adaptation

سرعة عملية الامتصاص والنتح تعتمد على الظروف البيئية المحيطة بالنبات (المجموع الخضري الجذري)، صفات النبات (تركيب الاوراق وتوزيعها، عدد الثغور، تحورات الورقة)، وطور ومرحلة نمو النبات



## زيادة الشد المائي يؤدي الى التقليل من نسبة انبات البذور




Figure 5. Effect of drought stress on the germination of dormant *Capsella bursa-pastoris* seeds. The line represents the functional three-parameter logistic model— $G(\%) = G_{\max} / [1 + (x/x_{50})^{\alpha_{rate}}]$ —fitted to the data.

## طرق التقليل من تاثير الجفاف فى الحقل عند زراعة البذور:

- 1- تغطية الحقل بعد زراعة البذور استعمال بقايا النباتات او بعض المواد المصنعة مثل حبيبات الاسبست او البلاستيك. هذة المواد تقلل التبخر من سطح التربة.
- 2- زيادة عمق البذار بحيث لا يؤثر عكسيا على انبات البذور. العمق المناسب يعتمد على حجم البذور ونوع المحصول ونسجة التربة.
- 3- زيادة سطح التماس بين البذرة والتربة من خلال دقة اجراء العمليات الزراعية ودك التربة بخفة بعد الزراعة.
- 4- نقع البذور قبل الزراعة
- 5- تغطية البذور بمواد ذات قابلية جيدة لامتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها لفترة طويلة. وبالتالي يمكن للبذور ان تاخذ الماء من هذة المواد بصورة مستمرة.



# تأثير الشد المائي على بعض العمليات الفسلجية في النبات

## ثانياً عملية البناء الضوئي Photosynthesis

تتكون عملية البناء الضوئي من اربعة عمليات رئيسية متداخلة:



1- دخول ثاني اوكسيد الكربون الى الكلوروبلاست

2- تكون طاقة كيميائية ضرورية لاختزال ثاني اوكسيد الكربون وذلك من خلال استغلال طاقة الشمس (تفاعل الضوء)

3- تثبيت ثاني اوكسيد الكربون باستعمال الطاقة المتكونة (تفاعل الضلام)

4- انتقال المواد المتكونة من الكلوروبلاست.

### Photosynthesis



### تأثير الجفاف على نمو النبات يكون من خلال:

1- غلق الثغور زيادة مقاومة طبقة الخلايا الاسفنجية (الميزوفيل).

2- تقليل مساحة الورقة.


3- التأثير في نشاط الكلوروبلاست.

4- حاجة عملية البناء الضوئي الى الكترولون يهبه اليها الماء.

Effects of drought on photosynthesis are generally minor

1- early effect: mostly via stomatal closure

2- late effect: metabolic breakdown



PLANT PHYSIOLOGY, Third Edition, Figure 25.4 © 2002 Sinauer Associates, Inc.

بزيادة الشد المائي في الورقة يقل اتساع ومساحة الورقة وتنخفض نسبة البناء الضوئي




# تأثير الشد المائي على بعض العمليات الفسلجية في النبات

## ثانياً عملية التنفس Respiration


يؤثر الشد المائي في فعالية الانزيمات المسيطرة على عملية التنفس ويؤثر على التراكيب الداخلية للميتوكوندريا ويختلف تأثير الشد على عملية التنفس من نبات الى اخر باختلاف حالة النبات من حيث توفر الغذاء المخزون عند تعرضه للشد (يقل الجهد المائي).

### Parts of a Plant Cell



Mouse over the following parts of a plant cell to learn about their functions:

- Cell wall
- Nucleus
- Vacuole
- Cytoplasm
- Chloroplast
- Mitochondria



# STRESS RESISTANCE MECHANISM

## تجنب Avoidance:

تمتاز هذه النباتات بان لها القابلية على المحافظة على الضغط الانتفاخي من خلال نمو المجموع الجذري عميقا في التربة ومن خلال التحكم العالي بفتح وغلق الثغور وعملية النتح بالاضافة الى تقليل الماء المفقود من خلال الانسجة

## مقاومة Tolerance:

هذه النباتات لها القابلية لمواجهة نقص الماء في التربة مع القليل من طاقة ماء الانسجة تتم عملية مقاومة الجفاف وهو الحفاظ على ضغط الانتفاخي للخلايا من خلال تنظيم الجهد الازموزي وزيادة مرونة الخلية وتقليل حجم الخلية.

## الهروب Escape:

يمكن تعريف هذه النباتات بان لها القابلية على اكمال دورة حياتها قبل نفاذ الماء المتوفر من التربة وقبل قدوم الموسم الجاف

# Morphophysiological mechanisms for drought stress in plants

## الصفات المورفوفسيولوجية الخاصة لنباتات المناطق الجافة

1- تحورات الاوراق : هناك بعض الصفات التي تتميز بها اوراق النباتات المناطق الجافة ومن هذه الصفات

أ-صغر المساحة الورقية وكما تتساقط الكثير من اوراق النباتات عند حصول الجفاف كما هو الحال في وتقل كمية التبخر الى 85%



(drought condition)

ب- تتأقلم اوراق بعض النباتات للجفاف **وتقليل النتج من خلال طي اوراقها** وبهذا يمكن ان تهبط من سرعة النتج بمقدار 40-60% فقدد لوحظت هذه الظاهرة في صنف الحنطة المحلي صابر بيك (ملاحظات المؤلف)

ج-من التكيفات الاخرى وجود الزغب او الشعر على الاوراق واحيانا على السيقان. ان هذا الزغب او الشعر حي مملوء بالساييتوبلازم وبالتالي سوف يزيد من سطح التبخر وبالتالي يزيد من حفظ درجة حرارة الاوراق وعكس ضوء الشمس.

# Morphophysiological mechanisms for drought stress in plants

## الصفات المورفوفسيولوجية الخاصة لنباتات المناطق الجافة

د- لاشك ان غلق الثغور يؤدي الى تقليل النتح بنسبة كبيرة. تختلف الاصناف في سرعة الغلق والوقت الذي تغلق الازم لغلق الثغور.

و- تختلف سطح الورقة وسمك طبقة الكيوتكل والتركيب الكيماوي. اوراق نباتات المناطق الجافة تكون ذات كيوتكل سميك جيد التكوين و سطح لماع لعكس نسبة اكبر من اشعة الشمس.

ك- كثافة الاوعية الناقلة:تمتاز اوراق هذه النباتات بزيادة كثافة وبروز العروق الوسطية. وزيادة العروق الوسطية تقلل من المسافة التي يقطعها الماء من الانسجة الناقلة الى الثغور وبالتالي تقل المقاومة التي تبديها الخلايا تجاه حركة الماء

**2- تحورات الساق:**تمتاز سيقان نباتات المناطق الجافة بقابليتها على خزن المياه. جزء من هذه المياه في يخزن في الاوعية الناقلة وهو في حالة حركة مستمرة. والجزء الاخر في الخلايا الاخرى. تختلف كمية الماء المخزون من نبات الى اخر. بعض النباتات تمتلك نسيجا فلينيا وبذلك تكون كمية الماء المخزون اكبر.

# Morphophysiological mechanisms for drought stress in plants

## الصفات المورفوفسيولوجية الخاصة لنباتات المناطق الجافة

### تحورات الجذر:

**أ-** تقوم جذور بعض النباتات الصحراوية بخزن الماء. بعض انواع الجذور تمتاز بقابليتها على زيادة تعمقها وامتدادها وتوسعها في التربة. تمتاز جذور بعض المحاصيل بسرعة نموها خلال مرحلة الانبات فيتكون مجموع جذري كبير قبل حلول موسم الجفاف.

**ب-** كلما كانت نسبة الجذور الى المجموع الخضري مرتفعة فان هذا يعني قابلية امتصاص عالية ان كبر حجم المجموع الخضري تعني زيادة فقدان الماء. بينما كبر حجم المجموع الجذري تعني زيادة كمية الماء الممتص.  
ان نسبة الجذور الى المجموع الخضري غير ثابتة وتعتمد على ظروف التربة والمناخ ونوع المحصول.

**ج-** قدرة عالي على امتصاص الماء: تتناسب حركة الماء من التربة الى الاوراق طرديا على فرق الجهد وتتناسب عكسيا مع المقاومة. لو اعتبرنا ان المقاومة ثابتة فان سرعة انتقال الماء من التربة الى الاوراق سوف تعتمد على فرق الجهد. هذا يعني كلما زاد فرق الجهد كلما زادت قابلية النبات على امتصاص الماء من تربة اكثر جفافا.

ان الجهد المائي في الاوراق يعتمد على الجهد الازموزي للخلايا مطروحا منة الضغط الانتفاخي. الجهد الازموزي ليس كمية ثابتة فهو يتغير تبعا لتركيز المواد وكمية الماء في الخلايا. ان الجهد الازموزي لهذه النباتات منخفض فهو اكثر سلبية من النباتات الاخرى ونتيجة لذلك فان القوى المحركة للماء الى اعلى تكون عالية.



## أهمية التغير في درجة الحرارة وتأثيرها في العمليات الفسيولوجية

- **التركيب الضوئي Photosynthetic** : أن هذه العملية تزداد بارتفاع درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة الحرارة المثالية ،وباستمرار الحرارة بالارتفاع تنخفض عملية البناء الضوئي وصولاً إلى درجة الحرارة العظمى . بعض أصناف نبات السرو تستطيع أن تقوم بعملية البناء الضوئي حتى في درجة حرارة -30 درجة مؤي بينما النباتات الصحراوية
- **عملية التنفس Respiration** :يزداد التنفس بزيادة الجفاف حتى يصبح عملية هدامة للنبات في درجات الحرارة العالية.

