

تاسعاً: رتبة متساوية الأجنحة Order :Isoptera

وتسمى كذلك بالنمل الأبيض white ants أو الأرضة termites. صفاتها العامة :

- 1- تمتلك زوجين من الأجنحة الغشائية المتطاولة المتشابهة بالشكل والمتساوية بالحجم تماماً، والتي تفقدها الحشرة بعد فترة من بلوغها.
- 2- أجسامها رخوة ذات ألوان باهتة .
- 3- أجزاء الفم قارضة ،اللوامس قلادية الشكل .
- 4- العيون البسيطة موجودة في بعض العوائل وأثرية في عوائل أخرى ولا تمتلك عيون مركبة.
- 5- القرون الشرجية قصيرة جداً .

6- توجد بثلاث أشكال وهي التكاثريات أو الملكات queen إذ تكون كبيرة الحجم وذات أجنحة طويلة والعاملات workers إذ تكون صغيرة الحجم وذات فكوك اعتيادية ،أما الجنود soldiers فتكون ذات رؤوس ضخمة وفكوك كبيرة .

*من أهم العوائل التابعة لها هي عائلة الأرضة Termitidae والنوع المنتشر في البيئة العراقية هو *Microcerotermes diversus* .



عاشرأً: رتبة مشابهة الأجنحة Order :Homoptera

لأفرادها الصفات التالية :



- 1- زوجاً واحداً أو زوجين من الأجنحة الغشائية أو الجلدية المتماثلة تماماً وتكون متجانسة القوام، وبعضها يفقد أجنحته خلال دورة الحياة .
- 2- أجزاء الفم ثاقبة ماصة ،اللوامس خيطية طويلة أو قصيرة جداً غير مخفية داخل أحاديد في الرأس .
- 3- تمتلك اثنتين أو ثلث عيون بسيطة مع وجود زوج من العيون المركبة .

*تضُم هذه الرتبة عدة عوائل ذات أهمية اقتصادية ومنها :


1- عائلة المن (قمل النبات Family: Aphidae)

وتمتاز بأنها حشرات صغيرة ملساء بعضها مجنة وأخرى غير مجنة لوامسها طويلة ويوجد زوجاً من التراكيب الأنبوية على السطح الظاهري للحافة البطنية الخامسة تسمى بالقرنيات cornicles تفرز مادة شمعية وقائمة. ويفرز الشرج مادة الندوة العسلية (honey dew).



2- عائلة الحشرات القشرية Family: Coccidae (scale insects)

يختلف الذكر الكامل كثيراً عن الأنثى الكاملة فالذكور مجنة والإإناث غير مجنة مغطاة بقشرة . الزوج الأمامي من الأجنحة واسعاً ويحوي عدد قليل من العروق بينما الجناح الخلفي مختلف إلى دبوس التوازن. الذكور الكاملة لا تتغذى وتصبح أعضاء الفم أثرية . التحول تدريجي تفاصيل البيضة عن حوريات نشطة ثم بالغات .



الحادي عشر: رتبة نصفية الأجنحة Order :Hemiptera

وتمتاز بأن :

1- الجناح الأمامي يكون نصف غمدي ، والخلفي فهو من النوع العشائي.

2- أجزاء الفم ثاقبة ماصة وتكون بشكل خرطوم يتجه نحو الخلف .

3- اللوامس خيطية قصيرة جداً أو طويلة نوعاً ما.

4- تمتلك عيون مركبة كبيرة وبعضاً لا يمتلك عيون بسيطة .

*تقسم هذه الرتبة حسب طول اللوامس إلى رتيبتين وهما :



أ- رتبة مخفية اللوامس sub order :Cryptocerata

تكون اللوامس فيها قصيرة جداً مخفية داخل أحاديد في الرأس، وتعد أفرادها الأكبر حجماً في صنف الحشرات ، لا تمتلك عيون بسيطة وتنكيف أرجلها الأمامية للفنص والخلفية للسباحة . ومن أهم العوائل التابعة لها هي :

1- عائلة البق العملاق Belomastidae (giant water bugs) ، ومن الأنواع الشائعة الانتشار هي بقة الماء العملاقة *Lethocerus niloticus*

2- عائلة عقارب الماء Family :Nepidae (water scorpion)

حشرات نحيفة وأرجلها طويلة والأرجل الأمامية متحورة للفنص والصفة المميزة وجود لواحق تنفسية ذنبية في نهاية البطن وهي لاتسبح بل غالباً تمشي على النباتات المائية .

ب- رتبية ظاهرة اللوامس sub order :Gymnocerata

تكون اللوامس فيها طولية و ظاهرة بشكل واضح خارج الرأس , ومن أهم العوائل التابعة لها:

1- عائلة البق النتن Family :Pentatomidae (sting bugs)

* حشرات خضراء اللون أجسامها صغيرة ومسطحة تشبه الصدفة , تمتلك عيون بسيطة من الأنواع الشائعة هي البقة الخضراء *Nezara virdula* .

2- عائلة بق الفراش Family :Cimiciidae (bed bugs)

* حشرات باهنة اللون ذات أجسام مسطحة غير مجنة ولا تمتلك عيون بسيطة . ومن الأمثلة الشائعة هو النوع *Cimex lectuarius* .



الثاني عشر: رتبة هدبية الأجنحة Order :Thysanoptera

وتمتاز بالصفات التالية :

1- تمتلك زوجين من الأجنحة الغشائية المتطاولة والعروق فيها مختزلة مع وجود مجموعة من الأهداب الطويلة والقصيرة .

2- أجزاء الفم من النوع الخادش الماصل وتمتاز بفقدان الفك الأيمن .

3- اللوامس شبة قلادية طويلة تحوي بعض الشعيرات الحسية .

4- عديمة القرون الشرجية .



5- بالرغم من أن تحولها تدريجي ولكن وجد في دورة حياتها دور بدائي يشبه العذراء .

* تقسم إلى رتيبتين حسب نهاية البطن ووجود آلة وضع البيض هما :

أ- رتبية ذوات آلة وضع البيض المنشارية Sub order :Terebrantia

الأجنحة الأمامية أكبر حجماً من الأجنحة الخلفية ، تكون نهاية البطن في الذكور مدوره وفي الإناث مخروطية وجود آلة وضع البيض منشارية الشكل في الإناث . ومن أهم العوائل التابعة لها هي عائلة التربس العام Family : Thripidae وابرز أمثلتها ثربس البصل *Thrips tabaci*

ب - رتبة ذوات النهاية الأنبوية Sub order : Tubulifera

الأجنحة الأمامية والخلفية متساوية بالحجم بعض الأنواع تفقد أجنحتها تكون نهاية البطن في الجنسين أنبوية مخروطية الشكل وعدم وجود آلة وضع بيض متميزة في الإناث . ومن أهم العوائل التابعة لها Family *Haplorthripis cottei* : وأكثر الأنواع انتشارا هو ثربس القرنفل Phleothripidae

